

활성비타민, 항산화성분 함유

에스비타

연질캡슐

YESVITA

에스비타연질캡슐은 현대인들에게 필수적인 18종의 비타민과 미네랄이 균형있게 처방된 종합영양제입니다. 에스비타연질캡슐은 활성비타민 B₁(푸르셀티아민), B₆(피리독신염산염), B₁₂(시아노코발라민)를 함유하여 파로몰질(젖산, 초성포도산)을 분해·배설시켜 원기회복에 도움을 주며, 신경의 흥분 및 조절작용을 통해 인체내 신진대사를 원활히 해 줍니다. 또한 활성비타민은 정에서 파괴되지 않고 흡수가 잘 되어 높은 혈중농도를 나타내며, 생체이용률이 일반비타민에 비해 매우 높습니다. 에스비타연질캡슐은 셀레늄, β-카로틴, 비타민 C, 비타민 E, Mn, Cu 및 Zn 등의 항산화 성분을 곁합함 함유하여 노화 지연과 혈액순환 개선, 면역력 증강 등에 우수한 효과를 나타냅니다. 그리고 골다공증 예방에 주고 치아건강에 필수적인 비타민 D도 함유되어 있습니다.

■ 성분·함량 : 1캡슐 중

셀레늄함유근조효소(KP).....	92.6mg	폴산(KP).....	0.2mg
(셀레늄으로서 50μg)		d-비오틴(USP).....	45μg
β-카로틴현탁액30%(KP).....	20mg	무수인산수소칼슘(IP).....	50mg
(β-카로틴으로서 6mg)		(칼슘으로서 14.7mg)	
아스코르브산(KP).....	250mg	무수황산제이구리(EP).....	1.255mg
토코페롤아세테이트(KP).....	200mg	(구리로서 0.5mg)	
(비타민 E로서 200 I.U.)		푸마르산철(KP).....	30.5mg
농축콜레칼시페롤(유상).....	0.4mg	(철으로서 10mg)	
(비타민 D로서 400 I.U.)		황산망간수화물(USP).....	2mg
푸르셀티아민(KP).....	5mg	(망간으로서 0.65mg)	
리보플라빈부타레이트(KP).....	12mg	산화아연(KP).....	5mg
판토텐산칼슘(KP).....	30mg	(아연으로서 4mg)	
피리독신염산염(KP).....	1mg	참가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호	
니코틴아마이드(KP).....	20mg		
시아노코발라민(KP).....	4.9μg		

■ 성 상 : 적각색의 유상 내용물을 함유한 알갱이의 장방형 연질캡슐

■ 효능·효과

- 다음 경우의 비타민A, B₁, B₆, C, D, E의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육유량
 - 구루병의 예방 - 말초혈행장애 및 경련시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목경직, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움) - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 - 잇몸출혈 · 비출혈(코피) 예방 - 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

■ 용법·용량 : 1일1회, 1회1~2캡슐 식후 복용

■ 사용상의 주의사항

- 경고
 - 임부나 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오.(비타민 A결핍증 환자는 제외)
 - 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 결손성 5) 혈액소중(혈대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 폐모세관질환, 비철결핍성 빈혈
 - 6) 신장결석 환자
 - 7) 심한 증상의 신부전 환자
 - 8) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 9) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레도도파
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 혈당증 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 2) 이 약은 황색5호(설타렛로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반 의약품
분류번호 : 319

- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다(는) 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
 - ② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타난)대장염 등의 위장질환 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 간성배당체를 투여 중인 환자
 - 9) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자
 - 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 11) 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절 부종(부기)
 - ② 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(홍열되어 붉어짐)
 - ③ 묽은변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감
 - ④ 저혈압, 얼굴덜아름, 심박동불규칙, 피부발진
 - ⑤ 두드러기, 광선과민반응, 복부(배부) · 위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증
 - ⑥ 피부병, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조골증
 - ⑦ 위 · 장관(장자)장애, 소화장애, 폐부종(부기)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
 - 10) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외)한 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있습니다.
 - 11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 12) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜하십시오.
 - 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
 - 3) 각종 요검사시에 혈당의 검사를 방해할 수 있습니다.
 - 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 의해 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
 - 6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정수용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 ■ 사용기간 : 제조일로부터 24개월 ■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 제조의뢰자 : (주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동))

■ 제조자 : (주)알피코프 (경기도 화성시 향남읍 제곡공단4길 35-7)

- * 의약품용 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어와 하야, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오
- * 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
- * 구입시 사기거나 또는 유효기간이 경과되었거나 변질 · 변색 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자분쟁해결 기구)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약물안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

* 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2015. 07. 06
VVS01-150706-06

판매자 :



중 군 당

본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 8
 공정 : 충남 천안시 성기읍 망향로 797-48
 소비자상담실 : 080-6776-0800(수신자 부담)