

위통, 속쓰림에 효과 빠른 위장약

라니포스정

【원료약품의 분량】 1바이알 중

라니티딘염 산염 (USP).....	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘 (K.P).....	50mg
규산알루미늄 산마그네슘 (NF).....	125mg
수산화알루미늄 산마그네슘 (KPC).....	100mg
첨가제(타르색소) : 황색 4호	

【성상】

황색의 원형 필름 코팅정제

【효능·효과】

위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

【용법·용량】

성인(15세이상,80세미만) :

1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용하십시오.
단, 1일 2회(4정)를 넘지 않도록하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 다음 질환으로 치료받고 있는 환자 :

혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 면역계질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)

2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복 복용에 조심할 필요가 있습니다.)

3) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)

4) 히스타민 H2위·수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 사람

5) 소아(15세미만) 및 고령자(80세이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다). 80세 이상의 고령자에게는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아서 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 하십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약제를 복용중인 환자 : 약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.

2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람

3) 고령자(65세이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여합니다.

4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소등의 혈액 이상이 인정될 수 있습니다. 이러한 증상은 본제의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은

폐시킬 수 있습니다.

5)원인 불명의 체중 감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

6)복통이 지속되고 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

1)알레르기 증상(발진, 발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)

2)이 약의 복용 후 즉시 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우

3)고열을 동반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우

4)목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함, 출혈하기 쉽게 됨(치경의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우

5)항달

4. 일반적인 주의

1)3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

2)2주간을 초과하여 연용하지 마십시오.

3)이 약을 복용할 때에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오. (혈중 알콜 농도를 높일 수 있음)

4)정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5)기대된 효능 이외의 증상에는 복용하지 마십시오

5. 상호작용

1)이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.

- 테트라사이클린계 항생 물질(테트라사이클린 등)

- 뉴-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)

2)이 약을 다른 위장약과 병용하지 마십시오. : 다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

6. 임부 또는 임신 중일 가능성 있는 부인 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여한 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.

7. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)

8. 고령자에 대한 투여 (65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리 기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.

9. 저장상의 주의 사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2)직사광선이나 고온을 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.

3)오용을 피하고, 품질을 보호 • 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장 단위】 자사 포장단위

【저장방법】 기밀 용기, 실온(1~30℃) 보관.

※ 이 첨부 문서 작성 일자 (2009년 06월 02일) 이후 변경된 내용은 홈페이지

www.schnellkorea.com이나 소비자상담실 (02-561-4011)에서 확인할 수 있습니다.

※ 구입 시 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 소비자 상담실 (02) 561-4011