



갱년기 장애 여성호르몬 대체요법제 미시업정-골드

【제품명】 미시업정-골드

【성분·함량】 정(100mg)중
세인트존스워드80%메탄올추출물(생규) 84mg
사당삼이추출물(생규) 0.0364ml

참가제(타르색소): 적색4호
동물유래성분: 유당(젖당)수화물(소, 우유)
【성상】 적색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

갱년기 다음 증상의 완화

- 홍조, 땀이 남
- 정신쇠, 긴장, 신경과민, 집중력 부족, 불안 또는 우울증상
- 생리전의 불쾌감

【용법·용량】

성인: 1회 1정 1일 2회, 필요시 1회 2정 1일 2회 복용할 것.
아침, 저녁에 식사와 함께 복용할 것.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 나타내는 사람
- (2) 피부 광과민반응 병력이 있는 사람
- (3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(사용경험이 충분하지 않다.)
- (4) 다음 환자에게는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 항에스트로겐제(에타페리렌, 네비렌, 데라비르덴, 리미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아비카비르, 디노노스, 질사타빈, 인디나비르, 사키나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 알프라나비르 등)과 병용함께 복용(사용시) 이러한 항에스트로겐제의 치료효과가 떨어지고 내성이 발생(드러 남, 드래내)될 수 있다.
- (2) 카이모제 항응고제(아세노쿠마린, 헤파루린 등)의 항응고작용을 저해 한다.
- (3) 세포중성 약제제(아미노레틴, 시클로포스파미드, 타목시펜, 탁솔, 에도스타트 등)
- (4) 면역억제제(시클로스포린, 테르코리무스, 시클로리무스의 병용함께 복용(사용시) 혈당농도의 감소 및 면역억제효과의 저하를 야기시켜서 잠재적으로 심각한 결과(식기거부)를 초래 할 수도 있다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 형위를 하지 말 것.

- 강한 외와선 노출(장시간 일광욕, 태양광선, 선풍기)
- 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- (1) 이전에 알레르기 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위험이 있었던 사람
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 참보문서를 소지할 것.

- (1) 피부: 드물게 알레르기 피부반응(붉어짐, 가려움)이 나타나 는 경우, 혈색이 다른 피부의 민감성 이 증가하는 광과민반응이 나타나 는 경우(특히, 피부가 햇빛에게서 유발될 가능성이 있다.)
- (2) 정신신경계: 드물게 피로, 불안, 졸음, 초조가 나타나 는 경우
- (3) 소화기계: 드물게 위장관 장애가 나타나 는 경우
- (4) 간질환으로 의심되는 증상(피로, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위 의 통 증, 전한 노 등이 나타나 는 경우 간독성 이상반응이 보고된 바 있음.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- (1) 지금까지 이 약에 의한 급성 중독증상은 보고된 바 없다. 과용량 복용후 광독성 현상이 나타나 는 것으로 1~2주일 동안은 태양광선과 자외선으로부터 피부가 보호되어야 한다(외출시 시간을 줄이고, 의복 및 햇빛 차단제가 높은 햇빛보호제품을 이용하여 햇빛으로부터 피부를 보호한다.)
- (2) 이 약은 CYP-450 대사효소를 유도하므로, 이 효소에 의해 대사되는 다음 약물의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 반대로 이상반응을 유발할 수 있는 약들을 일시 투여시 이 약의 복용을 갑자기 중단하면 혈중농도가 증가할 수 있다. 따라서 다음 약의약품과의 병용함께 복용(사용)은 가능한 한 피하고 투여하기때 병용함께 복용(사용) 시에는 이상반응 발현 여부 및 이에 사해에 주 의해야 한다.
(1) 갑상샘(대기독신, 디코신, 메틸대기독신 등), 기관지확장제(아미노라민, 플리니도메릴, 테오필린 등), 항부정맥약(아미오돈, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파케논, 리도카인 등), 항경련약(페노 바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀 등), 진정수면제(미다졸람)과 병용함께 복용(사용)시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작시와 종료시 이러한 약들의 효과에 대한 신중 한 모니터링 실시가 필요하다.
- (2) 강구용 피임제(에타나에스트라디올, 데스게스트렐, 노르에티스테론, 레보노르게스트렐 등)와 병용함께 복용(사용)시 강구용 피임제의 효능 감소 및 부정 성(출혈)의 발현율이 증가할 수 있다.
- (3) 편두통치료제(세미타립탄, 나트립탄, 리자트립탄, 올리트립탄 등)와 병용함께 복용(사용)시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.
- (4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 항우울제(이미프라민, 이미트립탄, 노르트리핀, 시탈로 프람, 플루세타민, 플루복사민, 파록세틴, 네파조돈 등)와 병용함께 복용(사용)시 구역, 구토, 불안, 인장부담, 혼란이 나타나 는 등 이상반응이 증가할 수 있다.
- (5) 예사돈: 예사돈 혈중 농도 및 효과의 감소를 초래할 수 있다. 예사돈 치료를 받는 환자에서 47%까지 감소한 보고가 있다.
- (6) 지질저해제(스타틴과 같은 특정 HMG-CoA reductase 저해제(피바스타틴은 제외)와 스타틴으로 호르몬(강구용 또는 정맥 투여)의 작용에 영향을 끼칠 수 있다.
- (3) 정해진 용법·용량을 준수할 것.

7. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 약의품을 판매 용(용기)에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약의품의 오염(오염) 사용에 의한 사용 및 병상이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- (3) 직사광선을 피하고 빛을 줄 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【제조 의뢰자】 정우신약(주) / 총판 아산신 신정면 서부남로790번길 60

【제조자】 한국프라이머제약(주) / 전북 완주군 봉동읍 완주신대로 100

【판매자】 (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 선진로 42

- 본 약의품을 엄격한 품질관리하에 제조됩니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소지하지 분정제약 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 약의품을 사용하기 전에 참보문서를 주의깊게 읽어하여, 참보문서를 약의품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 사학저 온라인 약도약단(http://drug.mks.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- 소비자상담실: 02-574-2541