

헤카인 크림

Hecain cream

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

주성분 : 리도카인(USP) 96mg

[성상]

흰색~옅은 황색의 크림제

[효능·효과]

남성 성기 축각의 예민성 감소

[용법·용량]

성교 5-15분전에 연고로서 0.25-0.66g(리도카인으로서 23-62mg)을 도포한다
용량과 적용시간은 개인에 따라 다르며 최저유효량을 사용한다. 24시간 이내에 최대 2g(리도카인으로서 184mg)을 초과하여 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증인 경우
 - 적용 부위에 외상 또는 염증 환자
 - 상대방이 임신중인 경우
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 간·신질환 환자
 - 이 약은 프로필렌 글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 일반적 주의
 - 본인 또는 상대방에 발진 또는 자극이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 증상이 계속 되는 경우에는 의사와 상담한다.
 - 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.
- 적용상의 주의
 - 외용으로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.
 - 동일한 부위에 연속해서 3초 이상 분사하지 않는다.
- 저장 및 취급상의 주의
 - 유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 40℃ 이상의 고온 또는 저온의 장소, 일광이 닿는 곳에 보관하지 않는다.
 - 사용후 불 속에 버리지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 50g, 300g

- ※광범위한 부위에 국소마취를 과도하게 사용하지 마십시오.
- ※필요이상으로 고농도 제품을 사용하지 마십시오.
- ※상처가 있거나 자극받은 피부에 사용하지 마십시오.
- ※제품을 바른 피부에 랩 등을 감싸거나 열을 가하지 마십시오.

DS-0902-01

첨부문서 최초작성년월일 20080320

첨부문서 최종개정년월일 20090205

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전청 의약품정보서비스(ezdrug.kfda.go.kr) 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조원



동성제약주식회사

공장 : 충남 아산시 둔포면 관대리 36-25
본사 : 서울 도봉구 방학동 703-14

판매원

주식회사 웰빙해피팜

경기도 구리시 수택동 560-2 2층
소비자상담전화 : 031)567-6152