

충혈된 눈, 피로한 눈에

모아쿨

점안액



MOACOOOL Eye Drops



모아쿨점안액은 충혈된 눈을 회복시켜주는 아미노카프로산, 나파졸린염산염에 눈의 조절기능을 향상시키는 네오스티그민메틸황산염, 항히스타민제가 복합된 보건의약품입니다.
모아쿨점안액은 건조하고 피로한 눈, 충혈된 눈에 생기를 되찾아주어 눈을 맑게 해주며, 염증성 안질환의 치료에도 효과적입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

- 유효성분 : 아미노카프로산(KP) 10mg
네오스티그민메틸황산염(KP) 0.02mg
나파졸린염산염(KP) 0.02mg
클로르페니라민말레산염(KP) 0.1mg
- 첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(KP) 0.005mg
- 기타 첨가제 : 붕산, 에데트산나트륨수화물, 주사용수, 프로필렌글리콜, D-보르네올, I - 멘톨

【성상】 무색 투명한 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 점안(눈에 넣음)액

【효능·효과】

눈의 피로, 결막충혈, 수영 후 눈의 불편감 또는 먼지나 땀이 눈에 들어갔을 때, 자외선 및 기타광선에 의한 안염(눈염증) (설안염(눈(snow)에 의한 눈의 염증), 안검염(눈꺼풀의 짓무름), 하드콘택트렌즈를 끼고 있을 때의 불편감, 눈의 가려움, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

【용법·용량】

1회 2~3방울 1일 5~6회 점안(눈에 넣음)한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 눈의 통증이 심한 환자
- 2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상을 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)등을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 부작용(이상반응)

이 약의 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 충혈을 일으킬 수 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약의 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 3) 수일간 정도 투여후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 잘못하여 의복 등에 착색된 경우에는 물로 세척하여 제거한다.

4. 적응상의 주의

- 1) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.

모아쿨 점안액

MOACOOOL Eye Drops

- 2) 소프트콘택트렌즈의 장착액으로 또한 소프트콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 않는다.
- 3) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균(곰팡이) 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 않는다.
- 4) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
- 5) 사용기한을 초과한 것은 투여하지 않고 일단 개봉한 것은 가능한 한 빨리 사용한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광(햇빛)을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 15mL/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품 도서관([http:// drug.mfds.go.kr](http://drug.mfds.go.kr))을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 07

제조사
 **삼천당제약주식회사**
경기도 화성시 향남읍 제막공단2길 71

제조외주사
 **태극제약(주)**
경기도 화성시 향남읍 제막공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>