

시력감퇴 · 눈의 피로 · 약시 · 야맹증

부원

연질캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

빌베리건조엑스3.0%(생규)	20mg
(총 안토시아노시드로서 0.6mg)	
빌베리열매건조가루(생규)	40mg
(안토시아노시드로서 0.88mg)	
리보플라빈포스페이트나트륨(KP)	2mg
레티놀팔미테이트(비타민A로서 6,000IU)(KP)	6mg
첨가제 (타르색소) : 청색1호, 황색5호, 적색40호, 황색203호	

[성상] 진한 갈색의 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과] 시력감퇴, 고도근시, 안정피로, 중심 및 주변 망막변성에 의한 약시, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)

[용법·용량] 보통 성인 1일 1회 1캡슐을 아침 식사 전에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU이상 투여하는 경우 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것 (비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킨다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민A로서 1일 8,000단위 이상을 넘지 않도록 한다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 상호작용

비타민A의 소화 흡수 및 축적은 황산네오마이신과 코르티코스테로이드 및 페노바르비탈, 카페인, 알코올을 장기 투여하는 경우 개별적으로 감소되어질 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에는 비타민A 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 말 것.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손 되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 작성일(2013년 10월 14일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 전자민원창구(ezdrug.mfds.go.kr)의 '의약품등 정보' 나 소비자상담실(080-612-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[제 조 원] (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

[판매원]  일양약품 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110