

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

옥시메타졸린염산염(USP)	0.5mg
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(KP)	0.2mg

[성상]

무색 내지 미황색(연노랑)의 투명한 액

[효능·효과]


코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

[용법·효과]

성인 및 만 7세 이상의 소아 : 1회 2번씩 비강(코안) 내에 분무한다. 3시간 이상의 투여 간격을 두며 1일 6회를 넘지 않도록 한다.

■ 제품 사용방법

1. 뚜껑을 씌운채로 용기를 충분히 흔들어 주십시오.
2. 최초 사용시 뚜껑과 누액방지용 안전핀(흰색)을 제거한 후, 그 림과 같이 용기를 잡고 힘있게 눌러 균일한 분무가 이루어 지도록 5~6회 시험분무 하십시오.
3. 머리를 약간 숙인 후, 한쪽 코를 막은 상태에서 용기의 끝을 다른쪽 코안에 넣고 지시된 투여 횟수만큼 분무한 후 숨을 가볍게 들이마시십시오. 반대쪽도 같은 방법으로 분무한 후 숨을 가볍게 들이마십시오.
4. 사용 후 뚜껑을 닫고 용기는 똑바로 세운 상태로 보관하십시오. 지시된 횟수 이상으로 사용하지 마십시오.



[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 만 7세 미만의 유아
- 2) 만 2세 미만의 영아
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약(비염용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진·발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 7) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적, 부종, 자극감, 가려움
- 2) 3일간 사용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
- 6) 사용 시에는 음주하지 말 것.
- 7) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 25℃ 이하보관

[포장단위] 15mL, 30mL / 병

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 04. 20