

기억력 및 집중력 개선

징카프란[®]골드[™] 120mg

은행엽엑스120mg

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐 중

은행엽엑스(KHP) 120.0mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호

【성상】 황갈색의 내용물이 든 녹색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

이명(귀울림), 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

【용법·용량】

(성인) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 120밀리그램 1일 2회 경구투여(복용)합니다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하도록 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- ① 이 약에 과민증 환자
- ② 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- ③ 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- ① 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- ② 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로, 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

3. 일반적 주의

- ① 고혈압 환자 (이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.)
- ② 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

4. 소아에 대한 투여

- ① 소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

5. 임부에 대한 투여

- ① 동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 하십시오.

- ① 이상반응 : 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- ① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ② 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위(외부포장 표기참조)

【사용기간】 제조일로부터 24개월

홈페이지 : www.yungjin.co.kr 고객센터전화 : 080-990-8200

문서최초일 : 2006년 8월 9일

문서작성일 : 2013년 4월 27일

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 복용하십시오.

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 4월 27일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품은 복용할 때에 캡슐이 기도에 걸릴 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 고온에서 캡슐의 변형이 올 수 있으므로 취급주의를 요합니다.

※ 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【제조의뢰 및 판매원】

영진약품

공장 : 경기도 화성시 무하로 66

【제조원】

RP Corp

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제막공단4길 35-7(삼신리 906-6)

(주)알피 Corp
최대응재약 개발사