

[원료약품 및 분량] 1캡슐(약518.3mg)중

동글로로필린나트륨(KPC) 20mg
 제피형아스코르브산96%TypeSC(KPC) 156.25mg
 (아스코르브산으로서 150mg)
 염화리소짐(KPC) 30mg
 토크페올아세테이트50% 60mg
 (비타민 E로서 30IU)
 옥수수전분(KP) 120mg
 첨가제 : 유당수화물(소, 우유)

[성 상] 연두색의 분말을 함유한 상하부 녹색의 경질캡슐

[효능·효과] 치은염, 치조농루에 의한 잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름 등의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후복용

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 내용을 주의깊게 읽어야 하며, 의약품과 함께 보관하십시오.
 ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 정당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
 만약 구입 시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
 ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)—정보마당—의약품등 정보를 참조하여 주십시오.

제조사 (주)한국코러스제약 Hanmi 판매자 한미 메디케어(주)
 충북 제천시 강제동 253-12 서울시 송파구 방이동 45

120캡슐

일반의약품
 분류번호: 231

고단위 처방의 잇몸질환 종합치료제

덴타필 캡슐

풍치 / 발적 / 부기 / 치은염

치조농루 / 출혈 / 시린이

Hanmi



[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. : 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자 2) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자 3. 부작용 : 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 의부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다. 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다. 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 넣지 않는다. (작성연월일 : 2009. 10. 7)

제조번호 : 021802

사용기한 : 2013.07.25



8 806472 024818

120Caps.

일반의약품
 분류번호: 231

고단위 처방의 잇몸질환 종합치료제

덴타필 cap.

풍치 / 발적 / 부기 / 치은염

치조농루 / 출혈 / 시린이

Hanmi

