

잇몸질환에는 자이덴 캡슐

- ✓ 치 은 염
- ✓ 잇몸의 발적
- ✓ 치조농루의 여러 증상
- ✓ 부기 / 출혈 / 통증



광동제약(주)

120캡슐

[성분 · 함량] 1캡슐 중
염화리소짐(KPC) 30.0mg
아스코르브산(KP) 150.0mg
토코페롤아세테이트50%(KPC) 60.0mg
(토코페롤아세테이트로서 30IU)
동글로로필리나트륨(KPC) 20.0mg

[성상] 청록색의 분말이 들어있는 상하부 담청색의 경질캡슐제
[효능 · 효과] 치은염(잇몸염) · 치조이틀농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적(출혈되어 붉어짐) · 부기 · 출혈 · 고름 등의 완화

[용법 · 용량] 성인 1회 1캡슐 1일 3회 식후에 복용한다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[개정연월일] 2011. 07. 20

[판매처] 광동제약(주) 경기도 평택시 모곡동 440-2

[제조외화자] (주)엑스팜코리아 충북 진천군 문백면 장월리 112-3

[제조자] 청계제약(주) 경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
제품에 관한 문의는 전화(02)3473-6365로 하시기 바랍니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는
이지드럭(<http://ezdrug.kda.go.kr>) → 정보마당 → 의약품등 정보를 참조하세요.



[제조번호]

[사용기한]

잇몸질환에는 자이덴 캡슐

- ✓ 치 은 염
- ✓ 잇몸의 발적
- ✓ 치조농루의 여러 증상
- ✓ 부기 / 출혈 / 통증



광동제약(주)

120캡슐

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 난백달걀흰자 알레르기 환자
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 아토피피부염, 기관지천식, 약물 알레르기, 식물 알레르기 등의 알레르기성 소인이 있는 환자.
2) 양친, 형제 등이 알레르기 증상의 병력이 있는 환자.
3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등의 병력)이 있는 사람.
4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자.
- 부작용
이 약을 투여함으로써 발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과)사와 상의한다.
1) 속: 드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 인면(입술)창백, 사지냉감(팔다리 찬느낌), 혈압강하, 청색증, 의식불명 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절히 처치한다.
2) 과민증: 때때로 발진, 발적(출혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
3) 소화기계: 설사, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 드물게 구내염(입안염) 등이 나타날 수 있다.
4) 피부: 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안출혈, 구내염(입안염)등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 화상양물에 면 듯한 모양의 수종 등의 중증(심한 증상)의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증(심한 증상)의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사(치과)사와 상의한다.
3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 넣지 않는다.