

잇몸질환보조치료제

덴타-파워 캡슐

치주치료후 치은염

치주염의 보조치료



※ 사용 전에 첨부 문서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품 및 그 분량 (1캡슐 391mg 중)

리소짐염산염(KP)	30.0mg(역가)
아스코르브산과립(별규)(아스코르브산으로서 150.0mg)	154.64mg
토코페롤아세테이트2배산(BP)(비타민 E로서 5.0 I.U.)	10.0mg
카르바조크롤(KP)	2.0mg
첨가제(동물유래) : 리소짐염산염(닭·난백)	
첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호	

성상

연한 분홍색 가루가 든 상하부 청색의 경질캡슐제

효능·효과

치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료

용법·용량

성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2) 다른 약물을 복용하고 있는 환자
3) 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
4) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
5) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약 복용 후 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타난 경우
- 피부 : 피부점막안충후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(리엘증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적, 화상모양의 수증 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 장기간 계속하여 사용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위

10캡슐, 120캡슐, 240캡슐

취급상의 주의사항

※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질·변태 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 개정일자(2017년 07월 04일) 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(02-570-3972)에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 을 참조하세요.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※쉬운용어표기참고 :

난백(달걀흰자), 발적(충혈되어 붉어짐), 치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직), 구내염(입안염), 홍반(붉은 반점), 오용(잘못 사용)

제 조 자 : 알리코제약(주) / 충북 진천군 공혜원면 용소2길 21

첨부문서 개정년월일 : 2017. 07. 04
PI1707-01

제조외회사



일양바이오팜

충북 제천시 바이오밸리3로8
www.ilyangbio.co.kr