

소화가 안될 때!

10정

|             |              |
|-------------|--------------|
| 의약품<br>분류번호 | 233<br>건위소화제 |
|-------------|--------------|

# 위엔젤<sup>정</sup>

속이 편한  
복합 소화제

소화불량 · 과식 · 체합 · 위부팽만감

일반의약품



## [원료약품의 분량] 1정 중

### · 유효성분:

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 판크레아틴(USP) .....                                           | 175.0mg                  |
| (전분당화력 2961.81단위/일, 단백소화력 39643.31단위/일, 지방소화력 1331.36단위/일) |                          |
| 셀룰라제(KP) .....                                             | 50.0mg(섬유소당화력 62.39단위/일) |
| 우담즙 건조엑스(생규) .....                                         | 25.0mg(콜린산으로서 11.25mg)   |
| 디메티론(NF) .....                                             | 25.0mg                   |

· **첨가제(동물유래):** 우담즙 건조엑스(소·담즙), 유당수화물(소·우유), 판크레아틴(돼지·췌장)

· **첨가제(타르색소):** 청색1호, 황색203호

· **기타첨가제:** 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 실리콘디옥사이드, 전분글리콜산나트륨, 탭실드녹색(39G402), 탭실드클리어(92C569), 탭실드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 장방형의 장용피를 한 연색의 필름코팅정제

[효능 · 효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체합, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법 · 용량] 만 15세 이상: 1회 2정 1일 3회 식후에 복용합니다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야하는 환자

### 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

### 4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당 시 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 10정(10정/PTPX1)

[제조·외소재] 제이더블유중외제약(주) 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 56

[제조·소재] 정우신약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

### [교환 및 제품문의]

· 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.

· **연락처 : 고객센터 1588-2675 / 080-090-6777(수신자부담)**

· 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.



※ 첨부문서 작성연월일 : 2021.11.29 이후 변경된 내용은  
당사 홈페이지([www.jw-pharma.co.kr](http://www.jw-pharma.co.kr))에서 확인할 수 있습니다.

[제조·외소재]

**jw 중외제약**

제이더블유중외제약(주)  
충남 당진시 송악읍 한진1길 56

위엔젤정설명서-2111-J