

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

비타민이 첨가된 치질의 가려움, 출혈치료제

엑스칠플러스 연고 Exchiel plus Ointment

일반의약품
분류번호256

■ 원료약품 및 분량 : 1g 중

리도카인(K,P)	30mg
dl-메틸에페드린염산염(K,P)	5mg
히드로코르티손아세테이트(K,P)	5mg
클로르헥시딘염산염(K,P)	2mg
디펜히드라민염산염(K,P)	5mg
알란토인(K,P)	10mg
팔미탄산레티놀유(K,P)	1mg
(비타민A로서 1,000 I.U.)	
토코페롤아세테이트(K,P)	30mg
(비타민E로서 30 I.U.)	

■ **성상** : 이 약은 흰색~연한 노란색의 약간 특이한 냄새가 있는 연고제이다.

■ **효능·효과** : 다음 경우의 일시적 완화 : 치열, 치핵, 가려움, 부종(부기), 출혈

■ **용법·용량** : 1일 1~3회 적량을 항문 부위에 도포한다(바른다).

※ 항문내에 적용할 경우 주입기를 튜브에 끼우고 항문내에 삽입하여 사용한다. (주입기 사용시 약의 온도를 25℃ 이상으로 하면 사용이 편리함)

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 사용하지 말 것. 환부(질환부위)가 화농(괴음)되어 있는 사람. 심질환, 고혈압, 갑상선 질환, 당뇨병, 전립선 비대증으로 인한 배뇨곤란 환자. **2. 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의 할 것.** 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람 2) 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람. 3) 약에 의한 알레르기증상을 일으킨 적이 있는 사람 **3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것.** 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 사용에 의해 발진·발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기), 자극감, 화농(괴음) 등의 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담해 주십시오. 2) 7일정도 사용해도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다. 3) 출혈이 있는 경우 즉시 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 않는다. **5. 상호작용** 혈압강화제, 항우울약을 투여 중인 경우 사용전 의사 또는 약사와 상의한다. **6. 보관 및 취급상의 주의사항** 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 2) 직사광선을 피하고 가능한 한 습기가 적은 서늘한 곳에 캡을 잘 닫아 보관해 주십시오. 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말아 주십시오. 4) 사용기한이 지난 것은 사용하지 말아 주십시오. 5) 화기근처에 두지 않는다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ **사용기한** : 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최종 개정년월일 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명, 변경사항 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → [정보마당] → [의약품등 정보] 를 참조하세요.

최종개정년월일 : 2010. 7. 14

판매자
코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평동 48-5
<http://www.kolonpharm.co.kr>

제조사
CMIC 사막 씨엠오 코리아 주식회사

경기도 부천시 원미구 도당동 157-3

원료 및 기술제휴원
エスエス製薬株式会社