

【제 용 명】 경진해파신산입술(배농산급탕)

성 성 황갈색의 분말이 충전된 상부 연청색, 하부 삼구색의 캡슐

용법·용량 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간(식사와 식사 사이)에 복용한다.

저장 방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【효능·효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(괴물)성질환

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오해증과 별다른 증상, 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자

2) 항생제(抗菌薬)를 열이 없는 농양, 만성농기 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자 2) 신장애 또는 신장에(신장장애)환자 3) 부종(부기) 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

5) 고령자(노인)인(일반적으로 고령자)은 생리기능이 저하 되어 있으므로 감당(감당)하는 등 주의할 것 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성

을 일으킬 7) 지금까지 약에 의해 발진(발적)충혈되어 붉어짐, 가려움

등을 일으킨 적이 있는 환자 8) 어린이(어린이에 대한 안정성이 확립

되어 있지 않다(사용 경험)이다.)) 9) 이 약은 황색(호(타르)트린을

함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 한의사, 치과

의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를

소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증: 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(일 최대

복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우

저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 부종(부기), 체중증가

등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈장칼륨치의 측정)

을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (2) 근병증

(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수

이므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이

확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 피부: 발진·발적(충혈되어

붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계: 위부불쾌감등

2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속 하

여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것

2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제,

글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(푸로세미드, 에타

크린산 또는 타이디드제 이노제(트리클로로메타이드)와 병용(함께

복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)

이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께

복용할 경우에는 함유 성분의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용

후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 약의품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약의품

오염(오염)으로 인한 사고 발생이나 약의품 품질 저하의 원인이 될

수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

※ 본 약의품에 대한 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인 하실 수 있습니다.

※ 본 약의품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시

사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입하신

약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 소비자 상담실: 031) 642-0711

분류번호: 02630

제조·판매:



경진제약(주)
경기도 이천시 일원로 400번길 6



분리배출 8 806604 008815

【원료약물의 분량】

1캡슐(500mg)중

(배농산급탕)

지 실(KP).....0.50g

작 약(KP).....0.50g

길 경(KP).....0.67g

건 강(KP).....0.17g

대 추(KP).....0.50g

감 초(KP).....0.50g

상기수침진조엑스 405mg


참가제타르색산적색호 청색호 황색호

화농증·다래끼 각종염증

헤파신

캡슐

배농산급탕



일반의약품

10캡슐



효과빠른 생약성분