

소정씨정(배농산금탕)

【성분·함량】1정 중

배농산금탕조엑스(별규)	320mg
지실(KP)	500mg
작약(KP)	500mg
길경(KP)	870mg
건강(KP)	165mg
대추(KP)	500mg
감초(KP)	500mg

동물유래성분 : 유당수화물(KP)/소/우유

【성 성】 황갈색의 원형평면코팅정제

【효능·효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(농염)성 질환

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(출고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자.
- 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자.
- 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 고혈압 환자
- 심장에 또는 신장에(신장장애)환자
- 부종(부기) 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈 되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔·다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진·발적(충혈이 되어 붉어짐), 가려움 등

(4) 소화기계 : 위부(상복부)불쾌감 등

2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것.

4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5.저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).

2) 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

【포 장 단 위】 자사포장단위

【고객상담실】 02-574-2541

【제 조 자】 정우신약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

【제조외의사】 GP제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2012년 4월 27일 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.