



시원함에 향기를 담아

제놀원

카타플라스마

별도의 밀착포가 필요없는

일체형
스포츠제

장미향 첨가

어깨 결림

**그오토
니퍼**

**근육
피로**

타박상

끝부분부터 눌러서 밀폐하여 주십시오.

끝부분부터 놀라서 밀폐하여 주십시오.

시원함에 향기를 담아

제놀원

카타풀라스마

일반의약품 정보

[유효성분]		1매 (8 X 12cm, 8.2g) 중
d-킴파 (Kp)		54.88 mg
L-멘톨 (Kp)		109.71 mg
살리실산글리콜 (Kp)		164.57 mg
토코페롤아세티이트 (Kp)		32.91 mg

[효능·효과]
다음 증상의 진통·소염·항염: 타박상, 뱀·요하리통, 어깨결림, 근육통, 근육파로, 관절통, 동맥경·상처

[용법·용량]
1일 1~2회 약면의 필름을 떼어버리고 나서 **한부질한 부위**에 부착하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자 (부위) 에는 투여하지 마십시오.
1) 30개월 이하의 유아 2) 신진, 동맥에 의한 피부부위 상처부위

2. 다음 사항은 신중히 투여하십시오.
1) 저칼슘혈, 약이나 화상등 등에 의한 알레르기 증상 (예를 들면 발진·발적출혈등에 붙어진) 가려움,
알레르기 피부부위 등) 이 나타나 적외선 2 분 20 초까지 알레르기 체질인 환자
2) 알레르기 환자나 미량 단백질이 심한 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
5) 쇼아 (경련) 유발할 수 있습니다. 6) 이 약은 프로파판글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분
에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용
이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담하십시오.

4. 일반적 주의

- 1) 장어진 용병 · 용광을 잘 지키십시오.
- 2) 소에게서 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용하십시오.
- 3) 5 ~ 6월간 투여 후에도 중상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 적용상의 주의
이 약은 외용으로만 사용하십시오.

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- 2) 직사광선을 피하고 물 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 하십시오
- 3) 오일점토 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

[저장방법] 기밀용기 실온보관(1~30℃)

「포자다의」 5개

[사용기초] 제품 뒤면 쿼드프시이까지

[참가기업] 참가 기업 이름은 표지판까지
[참가기업] - 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산포름일 (KP) 8.2 mg, 파라옥시벤조산프로필 (KP) 4.1 mg • 첨가제
 (동물용약재성분) : 말린 토마토 추출물 • 첨가제 : 천연소식발효박하추출물, 글리세린 나트륨S-GG, 폴리비닐피롤리돈으로
 알코올 부직질 산화제인 소르비탄에스키울레이트, 실리카나이드로졸에서 테트라기프, 에테르산-티오퍼콜렌, 정제수,
 천연향료(정제수), 카복시메탈폴록소니움, 키토산, 티라드산, 폴리크로스베이트0, 폴리-α-글루텐-나트륨,
 프로판디올콜리

[성상]

무색 ~ 미백색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향성을 가진 카타플라스미제로서 밀착포가 접합되어 있습니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

※ 부작품 보고 : 한국악물업안전관리원(1644-6223)
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다.
구입시 사용기한 또는 유효기한이 지나거나 변질, 변형, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 상기 표시 사항 중 유효기한(2018년 5월 15일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greenross.com) 소비자상담실(080-280-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]

- 농산 전에 걸려있는 상하 건넌 도로이고, 도로, 화차에 기댄 채 농산 밑에 밭마대로 제철을 무렵히기 마삼시오.
 - 천한부위를 잘못하고 간조세에서 부후한지시오.
 - 옥같이 얹힌 부후이 파루 조 모뎀! 많은 부후에 부후한 경우는 마은조는 적히지 불려서 떼어 내시오.
 - 파루 열리지 방지를 위하여 등일부에서 연속적으로 사용하는 것은 패해주므로 가라중이나 발적 발진에 나빠질 경우
 시용을 중지하고, 환자를 보는 한테로 가라 주시오.
 - 파루, 은뎡진 전후는 파루가열이 행해지니 파루가 손상이 쉬우므로 배 체를 부후히 주시하십시오.
 - 파루에 이상 증상이 있을 때는 급기나 손대지 말고 속이 뜨거워 지는 것과 악열을 부후하시오.

제조판매자


GC 독십자

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL 031)269-0300

소비자상담실 TEL 080-260-0033



OTHER

호일-10-4022-6

인쇄크기 40x18mm
인쇄시 적색 문구, 박스 삭제해주세요.

(01)08806436049314