GC녹십자

붙이는 한방 근육통 치료제

제놀한방


카타플라스마



1 별도의 밀착포가 필요없는 일체형 살구색 습포제

5매

8 806436 033115



허리 통증 · 관절통 · 어깨 결림 · 타박상

뜯는 곳

붙이는 한방 근육통 치료제

제놀한방

카타플라스마

일반의약품
분류번호 264

일반의약품 정보

[유효성분] 1매 (8 X 12㎠, 8.2g) 중

d-캄파 (KP)	54.85 mg
l-멘톨 (KP)	109.71 mg
살리실산글리콜 (KP)	109.71 mg
치자연조엑스(3.0→1) (생규)	36.20 mg
토코페롤아세테이트 (KP)	32.91 mg
황백연조엑스(3.3→1) (생규)	76.80 mg

[효능·효과]
다음 증상의 진통 · 소염(창)] : 뼈, 타박상, 근육통, 관절통, 골절통, 요[허리]통, 어깨결림, 동창(언 상처

[용법·용량] 보통 성인의 경우 1일 1~2회 약만의 비닐을 떼어버리고 나서 환부[질환 부위]에 붙이십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자[부위]에는 사용하지 마십시오.
1) 30개월 이하의 유아 2) 습진, 옻 등에 의한 피부염, 상처부위

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등) 이 나타난 적이 있는 환자
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
3) 습윤습기 천이나 미련(짓무름)이 심한 환자
4) 의사의 치료를 받고 있는 환자 5) 소아(경련을 유발할 수 있습니다.)

3. 부작용
이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 부종[부기] 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 일반적 주의
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용하십시오.
3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 적용상의 주의
이 약은 외용으로만 사용하십시오.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.
3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 5매

[사용기한] 제품 뒷면 하단 표시일까지

[첨가제] •청기제(보조제) : 파라옥시벤조산메틸 (KP) 8.2 mg, 파라옥시벤조산프로필 (KP) 4.1 mg •청기제(동물유래성분) : 젤라틴 (소, 내피) •기타 청기제 : 건조수산화알루미늄겔, 글리세린, 나가종TS-620, 밀적포, 부직포, 소르비탄세스퀴올레에이트, 실리코나이즈드폴리메스티렌테이프, 에데트산나트륨수화물, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 카올린, 타르타르산 폴리비닐피롤, 폴리소르베이트80, 폴리아크릴산나트륨

[성상] 황색~이황색의 점착성고제물 부직포위에 도포한 방향성을 가진 카타플라스마제로서 밀적포가 접합되어 있습니다.

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 사용 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상 받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 상기 표시 사항 중 작성일자(2018년 5월 15일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실(080-280-0033)로 문의하시기 바랍니다.

[안전한 사용방법]
– 사용 전에 설명서를 상세히 읽어 보시고 효능, 효과상에 기재된 용도 이외에 임의대로 제품을 부착하지 마십시오.
– 칠흑부위를 꺼냈이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
– 목과 같이 연관한 부위나 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어 내십시오.
– 피부 알러지 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고 가려움증이나 발적, 발진이 나타날 경우 사용을 중지하고, 환부를 흐르는 찬물에 담가 주십시오.
– 사우나, 온욕질 전후에는 피부각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품 부착시 주의하십시오.
– 피부에 이상 증상이 생겼을 때에는 긁거나 손대지 말고 즉시 의사 또는 약사와 상담하십시오.

(01)08806436033115

제조판매자
GC녹십자
[주]녹십자
충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
TEL. 031)280-9300
소비자상담실 TEL. 080-280-0033

비닐류 OTHER

제조번호 / 사용기한 : 8월-10-4019-10

인쇄크기 40x18mm
인쇄시 적색 문구, 박스 삭제해주세요.