



[원료약품 및 그 분량] 100g 중

피레트린 엑스(KP) 0.66g
(총피레트린으로서 0.33g)
피페로닐부톡시드(KP) 4g
첨가제(타르색소) : 황색5호

[성상]

약간의 점성을 가진 연한 황색의 액체

[효능 및 효과]

머릿니, 사면발이, 몸이의 감염증치료

[용법 및 용량]

- 1) 반드시 사용상 주의사항과 사용설명서를 숙지(자세히 읽)하고 사용하십시오.
- 2) 반드시 건조 모발에 사용하십시오. 두피와 머리카락까지 충분히 적도록 마사지 해주시오. (사용량은 표 참고)
- 3) 완전히 도포(바름)가 된 후 10분간 방치합니다. (반드시 10분 이상은 사용하지 말 것)
- 4) 따뜻한 물을 이용하여 충분히 거품을 내어준 후 깨끗이 행구어 주시오.
- 5) 약물을 사용 후 모발에 남아있는 죽은 머리이나 석개는 반드시 석개제거용 빗(참빗)을 이용하여 제거하여 줍니다.
- 6) 한번 사용 후 완치가 되지 않았을 경우 10일 후에 다시 사용하여 줍니다.

모발 길이에 따른 사용량	
모발의 길이	1회 사용량(성인/어린이)
짧은 모발 (어깨선보다 짧은 길이)	1일 적용량 : 28g ~ 60g 10일 후 적용량 : 28g ~ 60g 총 사용량 : 56g ~ 120g
중간 길이의 모발 (어깨선 정도의 길이)	1일 적용량 : 60g ~ 85g 10일 후 적용량 : 60g ~ 85g 총 사용량 : 120g ~ 170g
긴모발 (어깨선보다 긴 길이)	1일 적용량 : 85g ~ 110g 10일 후 적용량 : 85g ~ 110g 총 사용량 : 170g ~ 220g

*반드시 사용 전 충분히 흔들어서 사용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2. 다음과 같은 증상이 있을 때는 의사와 상의한다.
1) 피부 자극이 있거나 약을 사용하여도 감염증상이 호전(나아짐)되지 않을 때
2) 눈썹이나 속눈썹에 감염된 경우
3) 알레르기, 두드러기
3. 일반적 주의사항
1) 이 약이 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 모발이 완전히 행구어 질 때 까지는 가능한 한 눈을 뜨지 않도록 하고 눈을 타올이나 수건 등으로 보호한다.
2) 소아에 이 약 투여시 보호자의 지도, 감독하에 사용한다.
4. 적용상의 주의
1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
2) 눈, 코, 입, 질 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 충분한 물로 완전히 씻어 낸다. 자극이 지속되는 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 노출된 상처, 절단, 아픈 곳이 있는 경우 의사 또는 약사의 지시가 없는 한 사용하지 않는다.
4) 만일 실패를 경우 즉시 의사와 상의한다.
5. 저장상의 주의사항
어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120g

「Q & A」감마린D액과 머릿니

본 제품은 살충작용을 하는 의약품입니다.
보통의 샴푸와는 구별하여 보관하시고
세정목적으로는 사용하지 마시기 바랍니다.

Q1 머릿니의 조기발견은?

머릿니의 성충은 2-4mm로 모근(두피) 부근에서 주로 발견되며 모양과 색은 깨와 같고, 알은 유백색의 좁쌀모양으로 머리카락의 옆에 단단하게 붙어 있으며 최초에는 모근과 거의 붙어 있으나 시간의 경과에 따라 모발의 성장과 함께 두피로부터 떨어집니다. 간혹 성충과 유충을 발견하기도 하나 대부분은 알 (사개)의 발견으로 감염을 알 수 있습니다.

Q2 머릿니의 알과 비듬 등 다른 것들과 어떻게 구별하나요?

머릿니의 알 (사개)는 머리카락에 붙어 단단하며 쉽게 떨어지지 않습니다.
머릿니의 알 (사개)는 부화가 끝난 후에도 붙어 있으며 부화여부는 육안으로 식별하기 어렵습니다.

Q3 감마린D액의 효율적인 사용방법은?

1. 건조한 머리 또는 머리감은 후 수건으로 물기를 없앤 후 충분한 양을 바릅니다.
2. 모발 사이사이와 두피에 골고루 바른 후 10분간 방치합니다. (10분을 넘지 마십시오)
※눈에 들어가지 않도록 주의 하십시오.
3. 따뜻한 물을 이용하여 충분히 거품을 내어준 후 깨끗이 행구어 주십시오.
※감염자가 사용한 빗, 머리핀, 머리띠, 침구류 등을 세척하거나 소독하여 재발을 방지할 수 있습니다.
(70° C 이상의 물에 30분간)

Q4 10일 후 재사용하는 이유는?

통상 1회로 모든 이 (성충, 유충, 알 포함) 을 제거할 수 있으나, 알의 상태는 겉이 딱딱한 물질로 싸여 있어 약의 흡수가 되지 않았을 경우, 알이 유충으로 부화된 뒤 7-10일 후 재사용을 권합니다.

Q5 머릿니는 얼마나 빨리 증식하나요?

알 7-10일 → 유충 7-10일 → 성충 생식기간 1개월

머릿니는 통상 생식기간 중 약 300개까지의 알을 낳으며, 그 알은 빠르게 약 2주후 성충이 되어 다시 알을 낳게 되므로 기하급수적으로 증식하여 집단 발생의 원인이 됩니다. 현대의 개선된 주거환경은 좋은 증식조건을 제공함으로써 조기발견과 퇴치가 중요함니다.

Q6 재 사용 후에도 이가 남아 있습니다. 어떻게 할까요?

재 사용 후 머릿니가 남아 있다면 아마도 새로운 감염이 일어났을 것입니다. 주변의 감염원인을 제거하여 주십시오. 참고로 가족 중 1명이 머릿니에 감염되었다면 모든 가족들도 감염가능성이 있으므로 확인하여야 합니다.
(머릿니 발견시 학교에 통보해 동료들의 머릿니를 함께 제거할 수 있도록 하는 것도 재발방지에 중요함니다.)

Q7 머릿니의 알이 그대로 남아 있습니다. 어떻게 해야 하나요?

머릿니의 알은 죽거나 부화 후에도 머리카락에 단단히 붙어 있게 됩니다. 떼어내기 힘들지만 손톱이나 가는 빗 (참빗)으로 정성껏 떼어주십시오. (베이비 오일을 사용하여 잘 문지른 후에 떼어내면 도움이 됩니다.)

Q8 머릿니가 개나 고양이등 동물로부터도 감염될 수 있나요?

머릿니는 사람에게만 기생하는 곤충입니다. 애완동물로부터 감염되지는 않습니다.

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용유효기간이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- * 사용(유효기간이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- * 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- * 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 04. 20