



베이텀 연고

(우레아)

일반의약품
분류번호:266

피부표면은 각질층의 수분이 부족하게 되면 피부가 건조해지고, 까칠까칠하고 푸석푸석하게 됩니다. 베이텀연고는 이러한 증상을 개선하여 피부에 촉촉한 느낌을 유지해 주는 연고입니다. 노인에게 많이 볼수있는 건조한 피부, 굳어져서 까칠까칠한 발꿈치, 복숭아뼈, 부엌일로 거칠어진 손 등에 사용하시면 매우 좋습니다.

[특 징] 우레아의 작용으로 거칠고 건조해진 피부를 회복시켜 줍니다.
천연토코페롤의 배합으로 피부보습, 노화방지효과가 증대(증가)되었습니다.
스쿠알란의 첨가로 항염증, 항소양 작용 및 보습효과가 강화되었으며, 우레아의 각질층으로의 이행을 촉진합니다.

[약리작용]

- 각질용해작용(角質溶解作用)**
: 베이텀연고는 비정상적으로 진행되는 여러 경우의 각화(각질화)증에 대하여 각화(각질화)촉진하여 피부 각화(각질화)현상을 없애줍니다.
- 각질내 수분보호작용(角質內 水分保持作用)**
: 베이텀연고는 수분손실을 억제하고 각질층의 함수능을 촉진하며, 수분의 체류시간을 연장합니다.
피부의 함수량 증대는 유지성분 함유량 보다도 피부연화에 있어 중요한 임상적 의미를 갖습니다.
베이텀연고는 스테로이드호르몬의 피부친화도를 높여 줍니다.
- 용해작용(溶解作用)**
: 베이텀연고는 과산화지방질을 용해하여(녹여서) 각종 피부질환에 대한 세정요법 또는 창상(상처)부 보호 요법으로 응용되고 있습니다.
- 살균작용(殺菌作用)**
: 베이텀연고는 20% 우레아 연고로서 본래의 살균작용이 피부와 및 외과 영역에서 널리 응용 되어 감염 창상(상처)이나 궤양에 단독으로 도포(바름)하거나 항생제, 항진균(항곰팡이)제, 화학요법제와 병용(함께 사용)하면 피부층내에서 살균효과를 상승시켜줍니다.
* 노인성건피증(피부건조증)(老人性乾皮症):
피부표면에서의 皮脂 분비가 적고 건조한 상태가 계속되는 질환으로 내인성 또는 외인성으로 일어나며 마른버짐과 같은 백색내지 회색의 비듬이 생김

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

우레아(KP)	200mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.6mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.4mg
첨가제(동물유래성분) : 스쿠알란(기원동물 : 상어, 사용부위 : 간유)	

[성 상] 전질균등한 백색 또는 미황색(연노랑)의 연고제

[효능·효과] 진행성 지장각피증(주부습진의 건조형), 손·발바닥 각피증, 어린성(魚鱗鮮), 노인성 건피증(피부건조증), 모공성 태선, 아토피 피부

[용법·용량] 1일 1~수회(여러 차례) 환부(질환 부위)를 씻은 다음, 이약을 바른후 충분히 문지른다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.
1) 안(눈)점막등의 점막

- 2) 이 약 성분에 과민증 환자
- 3) 급성 습진 또는 염증성 피부 질환 환자
- 4) 신부전(신장기능상실) 환자에 광범위하게 적용하는 경우
- 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**
 - 1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다.)
 - 2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다.)
- 3. 부작용(이상반응)**
 - 1) 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극 증상이 일시적으로 나타났거나 투여초기에 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감(화끈감), 인설(비늘, 껍질), 드물게 부종(부기), 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 4. 상호작용**
이 약에 의해 코르티코이드, 디트리놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.
- 5. 적용상의 주의**
 - 1) 이 약은 외용오로만 적용한다.
 - 2) 궤양, 미란(긁힘), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.
 - 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
- 6. 저장상의 주의사항**
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 냉소(시원한곳)15℃ 이하)보관

[포장단위] 50g, 60g, 65g

* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만 약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
* 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
* 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223) ☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정 연월일 : 2016. 01. 28

제조사
태극제약(주)
경기도 화성시 남양읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

M110029-01