

룩스린에프

연질캡슐

룩스린에프연질캡슐은 시력보호 및 개선효과가 있는 비타민A와 동물성 필수지방산의 집합체인 사육을 함유하고 있어 눈의 건조감, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) 등을 예방, 치료해줄 뿐 아니라 비타민 D를 함유하고 있어 뼈, 치아의 발육을 촉진시킵니다.

■ 특징

1. 체내에 비타민 A가 결핍되면 눈 조직 세포들이 노화되어 안구(눈)조직이 탄력성을 잃게 되어 눈이 건조해지게 됩니다. 룩스린에프연질캡슐은 비타민A를 함유하고 있어서 안구(눈)의 탄력성을 정상으로 유지시켜주는 윤활제와 같은 역할을 함으로써 눈의 건조감 및 이를 수반하는 각막 연화증(각막무름증)을 개선해 줍니다.
2. 룩스린에프연질캡슐은 망막에서의 Rhodopsin재생능력을 촉진시켜 광감수성을 높여주고, 어둠속에서 시력회복을 증진시켜 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)을 예방, 치료해줍니다.
3. 룩스린에프연질캡슐은 비타민 A, D, 인체에 필요한 필수지방산의 총체인 사육 및 동물로코필린을 주성분으로 하고 있어 시력 개선 및 뼈, 치아의 발육을 촉진시켜줍니다.

■ 원료약품 및 그 분량 (1캡슐 중)

사육(생구)	296.7mg
레티놀팔미테이트유(KP)	2.0mg
(비타민A로서 2,000IU)	
에르고칼시페롤과립(별구)	0.235mg
(에르고칼시페롤로서 200IU)	
동물로코필린(별구)	0.3mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호	
첨가제(동물유래) : 젤라틴(가원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)	

■ 성상 연두색의 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 알갱이의 타원형 연질캡슐제(앞 : LX R - F)

■ 효능·효과

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감 2. 치골의 발육불량 3. 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) 4. 구루병 예방
5. 다음 경우의 비타민 A·D의 보급 : 임신 수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)체력저하 때, 발육기, 노년기

■ 용법·용량 15세 이상의 성인 : 1일 1회, 2캡슐 / 7세 이상~15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5000 IU 이상을 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5000 IU/일 이상 투여하지 말 것.(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우. - 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성.
(임신전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000IU 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
- 3) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

실사

5. 기타 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 할 것.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 90캡슐(10캡슐 X 9), 120캡슐(10캡슐 X 12), 180캡슐(90캡슐 X 2), 240캡슐(120캡슐 X 2) / PTP

* 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변태·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.

* 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 03. 31



제조사
서웅

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61



제조의뢰자
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282