

팜코라민정

Pamcoramin Tab.

■ **성분 · 함량** 1정 중

푸르셀티아민 (식약청고시)	50mg
리보플라빈 (KP)	2mg
파리독신염산염 (KP)	2mg
시아노코발라민 (KP)	5 μ g
아스코르브산 (KP)	60mg
토코페롤아세테이트 (KP)	50mg
첨가제 (타르색소) : 청색1호 / (동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유)	

■ **성상** 타원형의 적색 필름코팅정

■ **효능 · 효과**

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 관절통(요통, 건통등), 눈의 피로, 구내염, 설염
- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, C 보급 : 영양 불량, 소모성질환, 육체피로, 병중 · 병후의 체력 저하시, 임신 · 수유기, 발육기 및 노년기

■ **용법 · 용량** 성인 1회 1정 1일 1정씩 복용합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 복용시 다음 사항에 주의하십시오.
1) 정해진 용법 · 용량을 지킴시오.
2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항에 주의하십시오.
1) 본제의 복용에 의해 위 불편감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
2) 본제의 복용에 의해 생리가 예상보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래 계속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
4. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ **저장방법 · 사용기간** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 자사기준

연락처 (02)848-8487 / **소비자상담실** 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된 KG.M.의 지적재산 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자:2010.04

이 첨부서는 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(<http://www.koreaprime.co.kr>) 나 제품문의처(02-848-8487) 에서 확인할 수 있습니다.



한국프라임제약

전라북도 완주군 봉동읍 둔산리 865-1,2