

비타민 및 미네랄 보급의 종합영양제

메가비타

MEGAVITA Soft Caps.

스트레스를 많이 받는 분, 병중 또는 병후 회복기에 있으신 분, 만성질환으로 체력이 약해진 분들은 쉽게 피로를 느끼며, 무력감, 영양 결핍 등이 나타나기 쉽습니다. 이러한 증상은 우리 몸의 각종 대사 과정과 체내 활동에 중요한 비타민과 미네랄을 충분히 섭취하지 못하기 때문에 나타나는 것입니다.

메가비타 영양결핍은

1. 우리 몸에 꼭 필요한 17가지의 비타민, 미네랄, 미량원소가 골고루 함유되어 있는 고단위 종합영양제입니다.
2. 특히 인삼이 함유되어 있어 피로회복, 자양강장에 우수한 효과를 나타냅니다.
3. 현대인의 불균형적인 식사와 노인, 허약체질자의 소화능력 장애에서 오는 영양 결핍을 막아주고 체내 활성을 증진시켜 줍니다.
4. 하루 1회, 1캡슐 복용으로 필요한 비타민, 미네랄을 한번에 복용할 수 있어서 간편합니다.

[원료약품 및 분량] 1캡슐(1,400mg) 중

레티날팔미테이트(KP)(비타민A로서 2400IU·U).....	1.412mg
티아민질염(KP).....	25.0mg
리보플라빈(KP).....	2.5mg
피리독신염산염(KP).....	1.0mg
시아노코발라민(KP).....	4.9µg
아스코르브산(KP).....	50.0mg
콜레칼시페롤을 유산염(BP)(비타민D로서 240IU·U).....	0.24mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 10.0IU·U).....	10.0mg
니코틴아마이드(KP).....	20.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	30.0mg
무수인산수소칼슘(KP).....	50.0mg
(인으로서 11.38mg, 칼슘으로서 14.73mg, 총 칼슘으로서 17.25mg)	
산화마그네슘(KP).....	10.0mg
(마그네슘으로서 6.0mg)	
산화제이동(KPC).....	1.0mg
(구리로서 0.8mg)	
황산망간(USP).....	2.0mg
(망간으로서 0.65mg)	
산화아연(KP).....	5.0mg
(아연으로서 4.0mg)	
건조황산제일철(USP).....	33.0mg
(철로서 10.0mg)	
인삼가루(KPC).....	100.0mg
(진제노사이드 Rb1으로서 0.2mg, Rg1으로서 0.1mg)	
파라옥시벤조산에틸(KP)(보존제).....	0.61mg
파라옥시벤조산프로필(KP)(보존제).....	0.15mg

[성상] 황색의 유상 내용물을 함유한 완적색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체 피로 - 수유기
- 병중·병후의 체력저하 - 발육기
- 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감의 완화, 야맹증 - 각기, 눈의 피로
- 뼈, 이의 발육 불량, 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등)

[용법·용량] 성인 1일 1캡슐 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
1) 임부여 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
2) 철 함유제는 6세이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하십시오. 만약, 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia) 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육경증, 신질환 환자

- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 월경순환
- 5) 혈액소중(혈액사 이상으로 혈이 간장, 폐장에 침착하는 질환), 해모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 6) 신장성 환자
- 7) 중증의 신부전 환자
- 8) 임부
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
3) 과산화노중환자(hyperoxaluria : 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
4) 수유부
5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장 질환이 있는 환자
6) 심장·순환기계기능 장애 환자
7) 신장애 환자
8) 저단백혈증 환자
9) 감성대당제를 투여 중인 환자
4. 이상반응
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
① 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 동종성 관절부종
② 어부비루배감, 설사, 붉은변, 변비, 발진, 발적
③ 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
④ 두드러기, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증
⑤ 흉만, 부진속, 중추신경계 기능 저하
⑥ 위장관장애, 소화장애, 폐부종
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경우로 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
6) 흡인이 부족한 환자에서 비타민B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.
4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이 상을 넘지 않도록 하십시오.
6. 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리안테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
가) 안신제, 칼슘제, 경구용대사아질린제 제제, 제산제
나) 레보도파
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.
7. 임부·수유부에 대한 투여
1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형 발현 증세가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용되는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 중으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 IU/일 미만을 넘도록 하는 등 적절한 주의를 하십시오.
- 8) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
8. 임상검사치에의 영향
1) 각종 뇨검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
9. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 100캡슐, 200캡슐

[사용기한] 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.
- 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 소비자 상담실(반문 및 교환처) : 02) 422-8422

제조원



한양약품(주)
한양약품(주) 계열사

설명서 개정일 2008. 11