

코큐민 연질캡슐

일반의약품

분류번호: 319

■ 원료약품의 분량 1캡슐 중

유비데카레논(코엔자임Q10)(KP)	5.00mg
토코페롤아세테이트(KP)	200.00mg
아스코르브산(KP)	500.00mg
β-카로틴 함탁액30%(KPC)	10.00mg
산화이연(KP)	17.43mg
셀라늄기루0.1%(KPC)	25.00mg
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호, 황색203호	

■ 성상 적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

■ 효능·효과

- 다음경우의 비타민 A, C, E의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
 - 높은 건조각의 완화, 야맹증
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 아연의 보급

■ 용법·용량 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 I.U. 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 I.U./일 이상 투여하지 않습니다.(비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(간난아기)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산소환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장에(신장장애) 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 위장관질환 환자
 - 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다. : 구역, 구토, 설사, 변비, 위부불쾌감, 위장팽만, 소화장애, 상복부통증, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 발진, 발적, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 비타민D를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
 - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000 IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
 - 4) 자살과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 상호작용
 - 1) 항알도스테르제, 트라이테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다. : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라 사이클린계 제제, 제산제
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
7. 임부에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
8. 임상 검사치에의 영향

각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
9. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질의 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ 포장단위 자포장단위

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.ejrp.co.kr)를 통해서 확인하실 수 있습니다. 만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하시기 바랍니다. 본 제품이 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불받을 수 있습니다. 약품 용어설명 및 기타 자세한 약물관정보는 식품의약품안전처 약물관리전문기관 온라인의약품도사전(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

소비자상담전화 : 080-353-6500 (수신자부담)

최초작성일 2010. 01. 07
최종개정일 2012. 03. 30

제조사 (주)서흥 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조외파자

JRP | 주 제이알피

강도화성시 함남읍 제1공단길 34-40