

토티칼연질캡슐

프란루카스트수화물

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분: 침강탄산칼슘(JP) 750mg(칼슘으로서300mg)
 농축콜레칼시페롤(BP) 0.1mg(콜레칼시페롤로서100IU)
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(기원: 소, 돼지 부위: 소, 돼지 가죽)
- 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색5호, 황색203호
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 소르비톨액(비결정성), 산화티탄, 에틸바닐린, 콩기름, 팜유

■ 증상

크림색의 점조성 액체를 함유한 암녹색의 장방형 연질캡슐

■ 효능·효과

1. 다음경우의 비타민 D의 보급
 - 임신·수유기
 - 발육기
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민D(농축콜레칼시페롤)
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
3. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

■ 용법·용량

만 12세이상 및 성인 : 1회 2캡슐씩 1일 1~2회 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상 태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아
- 4) 신결석 환자
- 5) 중증의 신부전 환자
- 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 감심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 신장결석 병력이 있는 환자
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

11) 이 약은 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고, 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위

100 캡슐/피티피

■ 제조발매원

(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단2길 18(상신리 901-3)

* 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서는 주의 깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자기본쟁결기준에 따라 교환·환불받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 발한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

* 부작용 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223), (14-3330)에 할 수 있습니다.

이 첨부문서의 작성일(2026년 03월 19일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템
 (https://nedrug.mfds.go.kr)이나 소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.