

※ 의약품용을 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.



소프트·하드콘택트렌즈를 착용했을 때의 불편감 해소를 위해

아이미루 콘택트퓨어 점안(눈에 넣음)액

일반의약품

분류번호: 131

콘택트렌즈의 착용으로 눈동자가 건조하고, 착 달라붙는 느낌이 들 때 ...

그런 증상은 각막표면을 손상시킬 수 있습니다. 이와같은 때는 점안(눈에 넣음)제를 사용하는 것이 중요합니다.

아이미루콘택트퓨어는 방부제를 포함하지 않습니다.

● 아이미루 콘택트퓨어의 특징

1. 콘택트렌즈로 인하여 부담을 주는 눈동자를 부드럽게 치유합니다.

「황산콘드로이틴나트륨」이 콘택트렌즈 착용으로 인하여 발생하기 쉬운 눈동자의 부담을 억제하여 피로한 눈을 개선합니다.

2. 피로한 눈 개선효과로 쾌적한 콘택트렌즈의 착용감을 얻을 수 있습니다.

쾌적한 착용감을 실현하기 위해서는 렌즈와 눈동자에 물기를 유지하는 것이 중요합니다. 본 제품은 물기를 지속시키는 성분이 있어, 건조 등으로부터 초래되는 불편감 등에 높은 효과를 발휘합니다. 게다가 2종의 아미노산성분(아미노에칠설펜산·L-아스파라긴산칼륨)과 미네랄성분(염화나트륨)이 눈 세포로의 산소공급을 개선, 눈의 신선대사를 촉진하여 눈의 피로·눈의 침침함을 효과적으로 개선합니다.

3. 방부제를 포함하지 않는 부드러운 사용감의 점안제입니다.

염화벤잘코늄, 소르빈산칼륨 등의 방부제를 배합하고 있지 않습니다. 또한 눈에 스며들지 않는 부드러운 사용감의 점안제입니다.

4. 소프트·하드 등 모든 콘택트렌즈에 안심하고 사용할 수 있습니다.

콘택트렌즈에 배합성분이 달라붙지 않으므로, 소프트 콘택트렌즈에도 안심하고 사용할 수 있습니다.

● 원료약품 및 그 분량

이 약 1mL 중	L-아스파라긴산칼륨(KPC)	5mg
	아미노에칠설펜산(JP)	10mg
	황산콘드로이틴나트륨(KPC)	2.5mg
	염화나트륨(JP)	3mg
	침가제트로메타를, 붕산, 붕사, 에데트산나트륨, 폴리소르베이트80, 정제수	

● 성상

무색 또는 미황색의 투명한 액이 무색투명한 플라스틱 용기에 든 점안(눈에 넣음)제

● 효능·효과

눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조), 하드 콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용시 불편감, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

[허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.]

● 용법·용량

1일 3~6회, 1회 1~3방울 점안(눈에 넣음)한다.

△ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 눈의 통증이 심한 환자
- 2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 부작용

이 약 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 하드콘택트렌즈를 착용하는 사람에게서 눈곱 등의 분비물이 많은 경우 드물게 렌즈가 흐리게 되는 일이 있으므로 이와 같은 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 2주 정도 투여후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 5) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.

4. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.
- 2) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균(곰팡이) 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(어지러움, 흐림)될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(어지러움, 흐림)된 것은 사용하지 않는다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 않는다.

5. 저장상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아)하여) 보관한다.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

● 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위

10mL

- 만약 유통과정 중 잘못으로 인하여 사용기간이 경과되었거나 변질, 변해, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사, 약사와 상담하세요.
- 이 첨부서 작성일자(2014년 03월 03일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr> 또는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) ▶ 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.
- 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>)
▶ (의약품 유해사례 보고)에 알려주십시오.
- 사용기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

수입·판매자: 씨제이헬스케어주식회사

서울 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 11, 12층
고객콜센터: 080-700-8802
<http://www.cjp.co.kr>

제조의뢰자: Lion Corporation

3-7, Honjo, 1-chome, Sumida-ku Tokyo, Japan

제 조 자: Nitto Medic Co., Ltd.

1-14-1, Yasuuchi, Yatsuo-machi,
Toyama-city, Toyama, Japan

FD-071012

[132633101] LD-140303