

통심락(通心絡) 캡슐

통심락(通心絡)은 최근 중국에서 신약으로 개발된 이후 중국 내 순환기 영역 시장을 주도하면서 급성장하고 있는 제품으로서 중국 정부로부터 의약품으로는 유일하게 국가 과학기술 진보상을 수상한 제품입니다. 중국 내 대형 양방의원과 중의원 다수에서 임상시험을 실시하여 과학적인 유효성과 안전성을 입증하였으며 현재 6,000개 이상의 병원에서 처방 되고 있습니다. 본 제품은 전갈, 수질, 선향, 오공, 자충 동물생각 5종과 인삼, 작약, 용뇌 식물생각 3종으로 구성된 혈액순환 개선제로, 협심증, 즉 가슴이 답답하고 찢는 것처럼 아프며 심계항진이 있고 식은 땀을 흘리고 숨이 차며 자주 피로를 느끼는 사람에게 효과가 있으며 또한, 뇌혈전증 회복기에 원기가 허약하면서 혈액순환이 잘 안 되는 환자에도 효과가 있습니다.

 국가 과학기술 진보상이란 중국정부가 수여하는, 공신력있는 과학기술상으로 1위는 원자탄, 2위는 통심락(通心絡)이 차지하였습니다.

성 상 용뇌향의 갈색 내용물이 든 적황색의 캡슐제

성분·함량 이 약 1캡슐 중

인삼(약전)	75mg
수질(생규)	103.75mg
전갈(생규)	78.75mg
오공(생규)	43.75mg
선향(생규)	68.75mg
작약(약전)	82.5mg
자충(생규)	88.75mg
합성용뇌(별규)	13.75mg
첨가제(타르스스) : 적색40호, 황색4호, 청색1호	

효능·효과 1. 뇌혈전증 회복기 환자의 혈액순환 개선 및 울체 제거
2. 협심증 (흉부 압박감 및 흉통(가슴통증))의 완화

용법·용량 1일 3회 1회 2캡슐씩 경구로 복용(사용)하며 보통 4주간 투여하십시오.
증상에 따라 1회 복용(사용)량을 4캡슐까지 증량(양을 늘림)할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

- 금기
 - 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 출혈성 질환을 앓고 있는 환자
 - 임신 또는 수유부
 - 생리중인 여성
- 부작용

캡슐 복용 후 위장관 불쾌감이 나타날 수 있으며, 이런 경우에는 식후에 복용하십시오.
- 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 고혈압 치료를 요하는 환자에게는 투여하지 않습니다.
- 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나, 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다
- 소아에 대한 투여

소아에 대한 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.
- 저장상의 주의사항

적사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

포장단위 제조원 포장단위

저장방법 밀폐용기, 건냉한 곳에 보관하십시오.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

설명서 개정연월일 : 2003.07.10
P1110-04

수입자/판매자 :

 **윙양약품주식회사**
경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 090-021-1010(수신지요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.yilang.co.kr

제조사 :

 **shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd.**
No.238 TianShan St.Shijiazhuang, Hebei, China