

※ 이 문서는 본제를 사용할 시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.

KGMP
우수약품지정업체

I-03

효과빠른 변비약 코딜로드^정

일반의약품
분류번호:238

【원료약품 및 그분량】 1정(350mg)중

도큐세이트나트륨(BP)	13.4mg
센나엽가루(BP)	55mg
(히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)로서 1.4mg)	
Tinnevely 센나열매가루(BP)	55mg
(히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)로서 1.2mg)	
비사코딜(BP)	5mg
식약청인정타르색소(KPTaCS) (황색4호, 청색1호)	

【성 상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제

【효능·효과】

-변비

-변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

성인(15세이상) 1회 2-3정을 1일 1회 취침시(공복시)에 복용한다.

다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자마힘) 환자
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여 하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 7세 미만의 영(젖먹이)·유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20정 X 20

【소비자상담실】 080) 597-1020

문서개정일 : 20100107

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



(주)아이원드제약

인천광역시 남동구 함박로 316(논현동)

www.i-pharm.kr



분리배출