

GAVISCON® 개비스콘® 더블액션 현탁액

일반의약품	
의약품 분류번호	232 소화성궤양용제

제 품 명 개비스콘 더블액션 현탁액

원료약품 및 그 분량 100mL 중, 유효성분: 알긴산나트륨 (EP) (건조물로서 4.375g) 5.00g, 탄산칼슘 (EP) 3.25g, 탄산수소나트륨 (EP) 2.13g, 침가제(보조제): 파라옥시벤조산에틸(EP) 0.4g, 파라옥시벤조산프로필(EP) 0.06g, 기타첨가제: 석카리나트륨, 수산화나트륨, 정제수, 카르복이산, 페퍼민트향

성 상 페퍼민트향이 나는 미황색~크림색의 현탁액

효능효과 다음의 위식도 역류의 증상 개선: ● 산 역류 ● 속쓰림 ● 위 내용물의 역류로 인한 소화불량 (예를 들어 식사 후, 임신 중, 역류성 식도염과 동반하는 경우의)

용량용법 성인 및 12세 이상 소아: 1회 10 ~ 20 mL을 1일 4회(식후 및 취침전) 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것: 이 약 또는 이 약 구성성분에 과민반응이 있는 사람. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것. 1) 유행성부진, 신장에 등과 같이 나트륨을 매우 제한해야 하는 환자(이 약은 20 mL당 254.5 mg(11.06 mmol)의 나트륨을 함유) 2) 고칼슘혈증, 신석회침착증(nephrocalcinosis)과 재발성 칼슘함유 신결석(recurrent calcium containing renal calculi) 환자(이 약은 20 mL당 260 mg(6.5 mmol)의 탄산칼슘을 함유) 3) 12세 미만의 어린이에 대한 복용은 의사의 지시가 아니면 일반적으로 추천되지 않는다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약에 민감한 매우 극소수의(1/10,000)환자에게서 가려움이나 기관지 수축, 아나필락시스 반응과 같은 알레르기 반응이 나타나는 경우 2) 탄산칼슘을 대량 섭취할 경우, 알칼리증, 고칼슘혈증, 산반동, 우유알칼리증후군 또는 변비가 일어날 수 있다. 이는 보통 권장량 이상의 용량을 복용할 경우에 나타난다. 3) 투약 7일 후에도 증상이 개선되지 않을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항. 1) 과량 복용시 즉시 병원에서 신속한 의료적 처치를 받을 것. 일부 환자는 복부팽만을 호소할 수 있다. 2) 제산제인 탄산칼슘의 작용이 있으므로 다른 약물과 2시간의 간격을 두고 복용할 것(예, 테트라사이클린, 디곡신, 플루오로퀴놀론, 철염(iron salt), 케토코나졸, 신경이완제(neuroleptics), 티록신, 페니실라민, 베타차단제(아테놀올, 메토프로롤, 프로프라놀롤), 글루코코르티코이드, 클로로퀸, 에스트라마스틴 및 디포스포네이트(diphosphonates)). 3) 임신여성에 복용시 임부나 태아 혹은 신생아에서 어떠한 이상반응도 관찰되지 않았다. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아서 보관할 것. 3) 이 약은 개봉 후 6개월 이내에 사용할 것.

제 조 자 일부공정위탁제조(제조의뢰자)/전공정위탁제조(제조자): Reckitt Benckiser Healthcare(UK) Limited, 영국, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, United Kingdom
일부공정위탁제조(제조자)(2차포장): PHARMAPAC UK Limited, 영국, Unit 20 and 23, Valley, Road Business Park, Bidston, Merseyside, CH 41 7EL, United Kingdom

수입자·판매원 옥시레킷벤키저, 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 24층(여의도동, 서울국제금융센터)
고객만족센터 080-022-9547

포장단위 4도, 12도

제조번호 및 사용기한 외부포장 참조

저장방법 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관(냉장 보관하지 말 것)

- 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁해결 기준에 의거 약국 개설자 및 의약품 판매업자를 통해 보상(환불) 또는 교환 받을 수 있습니다.
- 사용기한이 지난 의약품을 복용하지 마십시오.
- 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 업체 홈페이지(www.gaviskon.co.kr) 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하실 수 있습니다.
- 본 첨부 문서의 작성 및 개정연월일은 2017년 12월 1일이며, 이후 변경 된 내용은 위의 홈페이지에서 확인 하실 수 있습니다.



HEALTH • HYGIENE • HOME

옥시레킷벤키저
고객만족센터 080-022-9547
<http://www.gaviskon.co.kr>

3055276

