

아이월드 대시호탕약

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g)중

시호(KP)	2.00g	대추(KP)	1.00g
반하(KP)	1.33g	지실(KP)	0.67g
생강(생규)	1.67g	대황(KP)	0.67g
황금(KP)	1.00g	이상 연조엑스	2100mg
작약(KP)	1.00g	동물유래성분	유당수화물(소의 우유)

【성 상】 담갈색의 과립제

【효능·효과】 체격이 튼튼하고 비교적 건강하나 변비 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 위염, 삼승변비, 고혈압에 수반하는 어깨결림, 두통, 변비, 비만

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회 용량(3.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 유출작용에 의해 유·조산(조기 분만)의 위험이 있다.)
- 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논은 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 복통, 설사 등의 증상이 나타날 수 있다.)
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

8) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량 하는 등 주의할 것.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능 장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 간질성폐렴 : 발열, 기침, 숨참, 호흡곤란, 폐음이상(염발음, 捻髮音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속히 흉부X선 등의 검사를 실시함과 동시에 부신(공팔위샘)피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 받을 것.
 - 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- 1주(상습적 변비, 고혈압에 수반하는 변비에 복용하는 경우에는 5~6일) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 특히 주의할 것.
- 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것. 대황 함유제제는 특히 주의할 것.
- 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 201707

- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구 입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 함박로 316(논현동)

www.i-pharm.kr

