

The World's Most Clinically Proven Brand
of Natural Menopausal Therapy

remifemin®
레미페민®

일반의약품
분류번호:398

승마40%이소프로판올건조엑스(6~11 : 1)

갱년기란, 난소 기능의 저하로 체내에서 분비되는 여성호르몬 특히 에스트로겐의 분비가 감소되어, 월경이 멈추고 여러 가지 신체적·정신적 변화가 일어나는 시기를 말하며, 보통 한국 여성은 50세 전후에 이와 같은 증상을 경험하고 있습니다.

여성호르몬의 분비가 빠르게 감소하면서 여러 가지 갱년기 증상들이 나타나게 되므로 에스트로겐이나 프로그스테론을 보충하는 호르몬 요법을 치료방법으로 사용하게 됩니다. 그러나 2002년 미국의학 협회(JAMA)에 발표된 연구결과에서, 여성호르몬제의 장기복용이 관상동맥질환, 유방암, 뇌졸중 등을 증가시키는 것으로 나타남에 따라, 호르몬치료에 대한 우려가 증가하고 있습니다.

레미페민정은 1950년대 독일 Schaper & Brümmer사가 개발한 생약성분의 갱년기증상 치료제로 현재 미국, 유럽 등 전세계 수많은 여성들이 복용하고 있습니다. 갱년기에 나타나는 안면홍조나 이에 따른 식은 땀, 수면장애 등의 증상은 신체적으로뿐만 아니라 정신적으로도 무기력하고 우울하게 느끼게 함으로써 전반적으로 삶의 질을 저하시키게 됩니다. 장기간 증상이 나타나므로 치료약도 장기간 복용하게 되는데, 이 경우 사용 약물의 안전성은 치료약의 선택에 중요한 인자가 아닐 수 없습니다. 풍부한 임상자료를 바탕으로 그 안전성과 유효성을 입증해 온 레미페민정은, 호르몬 요법에서 나타날 수 있는 부작용 없이, 장기간 투여시에도 안전하고 효과적으로 갱년기 증상을 개선시켜 줍니다.

승마제제의 원개발사로서 그 명성을 이어오고 있는 Schaper & Brümmer사는 반세기 넘게 레미페민정을 생산해 오면서 원료에서 최종 완제품에 이르기까지, 철저하고 과학적인 제품관리를 통해 원료의 규격 표준화를 선도하고, 제조공정의 친환경화에 힘쓰고 있습니다.

■ 성분·함량

1정 중

승마40%이소프로판올건조엑스(6~11 : 1)(별규) 2.5mg

■ 성상

양면이 볼록한 흰색 또는 미황색의 원형 정제

■ 효능·효과

갱년기의 다음 증상의 완화

：홍조, 발한, 수면 장애 등 갱년기에 의한 정신적, 자율신경적 증상

■ 용법·용량

1회 1정씩 1일 2회(아침, 저녁), 씹지 않고 소량의 물과 함께 복용한다.

식사와 무관하게 복용할 수 있다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 이 약 및 이 약의 성분에 과민한 환자
 - 임부 및 수유부(충분한 자료가 없으므로 투여하지 않는다.)
 - 갈락토오스 불내성, Lapp 락타아제 결핍 또는 글루코오스-갈락토오스 흡수장애 등 희귀유전질환 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.[빈도 : 매우 자주(1/10 초과), 자주(1/100 이상, 1/10 미만), 때때로(1/1,000 이상, 1/100 미만), 드물게(1/10,000 이상, 1/1,000 미만), 매우 드물게(1/10,000 미만)]
 - 드물게 위장장애(소화불량, 설사), 피부 알레르기반응(두드러기, 소양, 피부발진), 안면부종, 말초 부종, 간기능 효소(트랜스아미나제) 증가 및 체중 증가가 발생할 수 있다.
 - 매우 드물게 승마를 함유한 약물 사용 중 간 손상이 드물게 보고된바 있으나, 약물과의 연관관계는 현재 증명된 바 없다.
 - 알려진 이상반응 이외의 이상반응이 발생 시 이 약의 복용을 중단하고, 의사, 약사와 상의할 것.
 - 이 약의 과량 복용 시 상기의 부작용이 증가 발생할 수 있으며, 이러한 경우 환자는 이약의 복용을 중단하고 의사와 상의할 것.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 월경장애 또는 월경의 재발 시, 불명확한 증상이 지속되거나 새로운 증상이 나타날 경우 의사와 상의할 것.
 - 이 약은 에스트로겐의 작용을 강화할 수 있으므로, 에스트로겐 병용은 전문가의 감독 하에서만 이루어져야 한다.
 - 간질환이 있는 환자에게는 주의하여 투여하며, 간손상이 의심되는 증상 및 징후(황달, 진한 소변색, 상복부 통증, 오심, 식욕감퇴, 피로)가 나타날 경우 이 약의 복용을 즉시 중단한다.
 - 이 약은 2주 이상 복용 시 효과가 나타나며, 의사와 상의 없이 3개월 이상 복용하지 않는다.
 - 알려진 상호 작용은 없다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 60정, 120정

※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는
구입처를 통해 교환하여 드립니다.

문안작성일 : 2008년 2월 12일

이 설명서 작성일자 2008년 2월 12일 이후 변경된 내용은
www.asiapharm.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



수입자

아주약품(주)

서울시 구로구 신도림동 413-13
소비자상담실 : 080-256-8000



제조사

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhoistraße 35 · 38259 Salzgitter, Germany
www.schaper-bruemmer.com

3615/038/00