

메 조 카 핀 주

(벤조산나트륨카페인)

(Caffeine and Sodium Benzoate Injection)

[분류번호 211 : 강심제]

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

(11%)

벤조산나트륨카페인(K.P.) 110mg

주사용수(K.P.) 적량

[성상] 무색 - 거의 투명한 액이 든 투명한 유리앰플주사제

[효능·효과]

1. 척추천자에 의한 두통

2. 알코올 또는 모르핀 중독에 의한 호흡억제시 호흡흥분 보조제

[용법·용량]

성인 : 벤조산나트륨카페인으로서 1회 100~500mg 근육 또는 피하주사한다. 긴급할 경우에는 정맥주사할 수 있다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것(유리앰플주사제에 한함).

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 위궤양 또는 그 병력이 있는 환자

2) 심장에 환자

3) 녹내장 환자

4) 이 약에 과민증 환자

3. 이상반응

1) 소화기계 : 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.

2) 순환기계 : 빈맥, 심계항진, 기외수축 등이 나타날 수 있다.

3) 중추신경계 : 불면, 흥분, 진전, 어지럼, 동공확대, 섬광암점(Scintillation-Scotoma), 이명, 불안 등이 나타날 수 있다.

4) 눈 : 만성 녹내장을 악화시킨다는 보고가 있다.

5) 기타 : 무력감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

이 약을 과량투여할 경우 우울증 환자를 더욱 우울하게 만들 수 있으므로 1회 용량이 1g을 넘지 않도록 한다.

5. 상호작용

1) 잔틴계 약물(아미노필린수화물, 디프로필린, 테오필린 등) 또는 중추신경 흥분제와 병용투여시 병용약물의 대사와 배설을 지연시켜 과도한 중추신경 흥분 작용이 나타날 수 있다.

2) MAO억제제와 병용투여시 빈맥, 혈압상승 등이 나타날 수 있다.

3) 시메티딘과 병용투여시 카페인 대사와 배설을 지연시켜 과도한 중추신경 흥분작용이 나타날 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

카페인 태반을 통과하여 모유중으로 쉽게 이행되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 장기연용을 피한다.

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

8. 과량투여시의 처치

1) 증상 : 소화기 증상(메스꺼움, 구토 등), 혈관 증상(부정맥, 혈압 상승 등), 정신 신경 증상(경련, 혼수 등), 호흡기 증상(호흡촉진, 호흡마비 등) 등의 악화를 일으킬 수 있다.

2) 처치 : 수액 등에 의해 이 약의 배설을 촉진한다. 흥분 상태에서는 대증요법으로 디아제팜, 페노바르비탈 등의 중추신경억제제 투여를 고려하고 호흡관리를 실시한다.

9. 적용상의 주의

1) 정맥주사를 할 경우에는 주사속도를 느리게 한다.

2) 주사바늘은 작은 것을 사용한다.

3) 근육 또는 피하 주사 시

(1) 신경 주행 부위를 피하도록 주의한다.

(2) 반복 주사하는 경우에는 주사 부위를 바꾸어 좌우 교대로 주사한다.

(3) 주사 바늘에 의해 격통을 호소하거나 혈액의 역류가 발생한 경우에는 즉시 바늘을 빼고 부위를 바꾸어 주사한다.

[저장방법] 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 2mL/앰플 × 자사포장단위

[사용기간] 제조일로부터 36개월

■ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 약국, 병원, 의원 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 본사 영업부에서 교환하여 드립니다.



(주) 제 일 제 약

대구광역시 달서구 성서로 18-29

(성서공단 2차단지 2지구 64B 2L)

TEL. (053) 583-6226~8

FAX. (053) 583-5775

- 작성년월일 1994. 6.24
- 개정년월일 2015.12.17

이 첨부 문서 작성일자 (2015년12월17일) 이후 변경된 내용은
http://www.jeilphar.co.kr나 (053)583-6226~8에서 확인할 수 있습니다.