

KGMP

우수의약품자문업체

생약변비치료제

일반의약품

분류번호: 238

I-04

루비락스과립**【원료약품 및 그 분량】** 1회용량(3.5g)중

차전자피가루(BP) 2168mg 센나열매가루(BP) 496mg

동물유래성분 : 유당수화물

【성 상】 갈색의 과립제**【효능 · 효과】** 변비 · 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배 부분) 팽만, 장이상발효, 치질**【용법 · 용량】**

성인 1회 1회용량(3.5g) 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는 식간)에 복용한다. 다만, 초기는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 (2) 장폐색(창자막힘) 환자
(3) 만 3세 미만의 영 · 유아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 (2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 (4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
(5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 (2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 (3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**【소비자상담실】** 080) 597 - 1020**【포장단위】** 12포, 12포 × 10EA, 500g, 30포, 180포

문서개정일: 201702

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

**(주)아이월드제약**인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr