



# 케노펜<sup>®</sup>쿨링 카타플라스마

일반의약품

분류 264  
번호 (진통, 진양, 수렴, 소염제)

원료약품의 분량 (1매 9x13cm<sup>2</sup> 11.7g중)

케토프로펜(KP) ..... 25.07mg  
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) ..... 11.70mg  
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP) ..... 5.85mg  
첨가제(타르색소) : 적색40호

## 성상

이 약은 연한 분홍색 또는 분홍색의 점착성 고체를 부직포 위에 도포(바름)하고 뒷면에 밀착표를 부착한 특유한 향기를 가진 카타플라스마제입니다.

## 효능·효과

다음 질환 및 증상의 진통, 소염(항염) : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건(힘줄)·건초염(윤활막염), 건(힘줄)주위염, 상완골(위팔뼈)상과염 (테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 통증(부기)·동통(통증)

**용법·용량** 약면의 박리지를 떼어낸 후 환부(질환부위)에 1일 2회 부착합니다.

## 사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
  - 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 과과민증의 병력이 있는 환자
  - 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
  - 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 베자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다)
  - 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 랫드에 이 약을 경구투여한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여(경구, 주사, 직장주입)시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다.
  - 15세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
  - 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
  - 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 임부 또는 수유부 (안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피합니다.)
- 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.
  - 상당시 가능한 한 이 봉투를 소지하십시오.
  - 드물게 속, 아나필락시양 증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.
  - 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거름), 호흡 곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다.
  - 피부 : 때때로 발진(종혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자국감 및 통증(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사일광(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지해야 합니다.

- 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
4. 타인이 이 약의 사용 시 주의할 사항
  - 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입습니다.(자외선에 의해 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다.)
  - 이 약에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다.
  - 피부감염증을 드러내지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄, 드러내보임)에 유의해야 합니다.
  - 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의해야 합니다.
  - 눈 및 점막에는 사용하지 않습니다.
  - 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의합니다
  - 무좀, 백선 등에는 사용하지 않습니다.
  - 밀봉봉대면을 사용하지 않습니다.
5. 저장상의 주의사항 : 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

**저장방법** : 차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

## <안전사용수칙>

1. 건조하거나 약한 피부에 부착하신 경우에는 땀 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다.
2. 햇볕에 노출되는 부위에 부착하신 경우에는 봉대나 의복 등으로 부직 부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있습니다.
3. 동일 부위에 연속적으로 사용하시는 것은 피하시는 것이 좋습니다.
4. 사우나, 온탕질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 이 약을 부착하실 때 주의하십시오.

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 이 문안은 2013년 10월 18일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

대외제약(주)

강원도 횡성군 횡성읍 한루로 495

※COOLING-5131018

제조번호

사용기한

제조의뢰자

일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우포로 27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

