일반의약품

[원료약품의 분량] 50mL 중, 산약(약전) 263mg, 감초(약전) 188mg, 인삼(약전) 94mg, 포황(생규) 94mg, 신곡(생규) 94mg, 대두황권(생규) 66mg, 육계(약전) 66mg, 아교(볼규)(기원:소, 사용부위: 기죽) 66mg, 직약(약전) 56mg, 맥문동(약전) 56mg, 황금(약전) 56mg, 당귀(약전) 56mg, 방풍(약전) 56mg, 백출(약전) 56mg, 시호(약전) 47mg, 복령(약전) 47mg, 길경(약전) 47mg, 행인(약전) 47mg, 천궁(약전) 47mg, 우황(약전)(기원:소, 사용부위: 담낭) 45mg, 영양각(생규)(기원:영양, 사용부위: 뿔) 38mg, L-무스콘(볼규) 570㎍, 용뇌(생규) 38mg, 백렴(생규) 28mg, 건강(약전) 28mg, 첨가제(보존제)벤조산나트륨(약전) 30mg

[성상] 특이한 방향성이 있는 갈색의 불투명한 액제입니다.

[효능효과] 뇌졸중(전신불수, 수족(손발)불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면(얼굴)(신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안, 급·만성경풍, 지율신경실조증, 인사불성

[용법용량] 보통 성인 1회 1병(1회 용량-1회 8~15세 2/3병(성인 용량의 2/3), 5~7세 1/2병(성인 용량의 1/2), 2~4세 1/3병(성인 용량의 1/3), 1세 이하 1/4병(성인 용량의 1/4)을 1일 1~2회 복용하십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃) **[포장단위]** 50mL

[사용상의 주의사항]

1.경고
혈압강하의 목적으로 복용할 경우에는 전문인의 지시에 따라 복용하십시오.

2.다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
1)고혈압 환자 2)심장병 또는 신장에(신장장애) 환자 3)부종(부기)환자 4)고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의하십시오.) 5)의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6)현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다. 7)식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)

3.다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1)이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1)위 알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(2)일 최대 배합량이 감초로서 1 g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.) (2)근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지권련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오. (3)피부 : 발진발적(충혈되어 붉어짐), 두드러기, 가려움 등 (4)소화기계 : 식욕부진 위부불쾌감, 구역, 설사 등 2)수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우

녹십자 GREEN CROSS

녹십자
원방

우황청심원
액

50mL

사향대체물질 함유

분류번호:219

4.기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1)장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 2)정해진 용법용량을 잘 지키십시오. 3)칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프게이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계이노제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육 병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오. 4)안면(얼굴)마비, 정신불안, 수족(손발)마비, 언어장애의 경우 유효율이 66.7% 이상 나타났다는 임상보고가 있습니다. 5)원방:황청심원과 변방:우황청심원의 비교임상시험결과에 의하면, 뇌자기공명영상(Brain MRI) 또는 뇌전산화단층촬영(Brain CT)을 실시하여 뇌졸중으로 확진되어 안정기에 있는 환자의 운동장애와 안면(얼굴)마비에 대하여는 원방이 변방보다 유의한 효과가 인정되었으나, 언어장애와 의식장애에서는 두 제제간 유의한 차이가 확인되지 않는 등 뇌졸중 증상에 따른 효과의 일관된 차이는 보이지 않았으며, 고혈압, 투통, 머리무거움, 어지러움 등 고혈압 증상의 경우에는 두 제제간 우위를 확인할 수 없다는 임상보고가 있습니다. 6)호흡곤란에 대한 효능이 입증되지 않아 효능효과 중 호흡곤란을 삭제하였습니다. 7)다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5.저장상의 주의사항
1)직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3)의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

※사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질변패 또는 오손된 제품은 구입하신 병의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※본제는 생약성분을 배합한 제제이므로 간혹 침전이 생기는 수가 있으나 약효에는 아무런 변화가 없으니 흔들어 복용하십시오.

종이

제조의뢰 및 판매자
녹십자 GREEN CROSS
충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50
TEL. (031)260-9300 (녹십자 상담실 TEL. 080-280-9003)
www.greencross.com

제조자
익수제약(주)
강원도 광주시 실촌읍 삼리 246-5
지함-10-2005-1

8 806436 048416

녹십자 GREEN CROSS

녹십자
原方

牛黃清心元
液

50mL

麝香代替物質 含有

제조번호:

사용기한:

原方
牛黃清心元
液