

에바페린 서방캡슐

Ebapherin SR cap.

분류번호 : 141 (항히스타민제)

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

수도에페드린염산염(USP)

120.0mg

에바스틴(EP)

10.0mg

식약청인정타르색소(적색40호)

■ 성 상 : 백색 내지 회백색의 구형과립이 들어있는 상하부 적색의 경질캡슐

■ 약리작용 및 특징

1. 에바페린서방캡슐은 기관지평활근, 말초 모세혈관의 H1-receptor에서 histamine의 작용을 경쟁적으로 억제함으로써 알러지 성비염 등의 증상을 신속히 완화시켜 줍니다.
2. 에바페린서방캡슐은 알러지성 비염의 주증상 중 하나인 코막힘을 효과적으로 제거하며 독성발생 가능성이 적은 완만한 유효혈중농도를 유지하므로, 심계항진, 두통 등의 이상반응을 일으킬 가능성이 감소되었습니다.
3. 에바페린서방캡슐은 상용량에서 졸음을 유발하지 않으므로 운전 등 정신집중을 요하는 경우에도 안심하고 복용하실 수 있습니다.

■ 효능 · 효과

혈관운동성, 알러지성 비염 및 감기에 관련된 비염 증상의 치료

■ 용법 · 용량

- 청소년(12~17세 사이) : 1일 1회 1캡슐

- 성인 : 1일 1회 1캡슐, 심한 경우 1일 2회 1캡슐 투여

치료지속기간은 증상이 심한 경우에 한하며, 일반적으로 의사의 지시 없이는 10일 이상 지속하지 않아야 합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 슈도에페드린이 함유되어 있으므로, 협우각성 녹내장, 뇨저류, 중증 고혈압, 관상부전, 갑상선기능항진증을 가진 환자 및 모노아민옥시다제 저해제(IMAO)로 치료받고 있는 환자 또는 2주간 치료를 받은 환자
- 3) 중증의 간장애 환자
- 4) 12세 이하의 어린이
- 5) 임부 또는 수유부

2. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 녹내장
- 2) 고혈압
- 3) 심질환 환자
- 4) 당뇨병 (이 약은 백당을 함유하므로 특히 주의해야 한다.)
- 5) 전립선 비대증 환자
- 6) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 (간장애를 악화시키거나 재발시킬 수 있다.)
- 7) QT 연장을 일으키기 쉬운 환자 [저칼륨혈증, 저마그네슘혈증, 선천성 QT 연장 증후군, 투석증, 아스테미졸, 베프리딜, 시사프리드, 스파르플록사신, β 차단제를 제외한 항부정맥약, 이노제, 정신병치료제 (페노치아진계, 부틸로페논계, 삼환계 · 사환계 항우울약 등), 프로부콜 등 QT 연장을 일으킬 수 있다고 알려져 있는 약물을 투여 중인 환자]
- 8) 간대사효소인 CYP3A4 효소를 억제하는 다음 약물을 복용 중인 환자
 - 아졸계 항진균제 : 케토코나졸
 - 마크로라이드계 항생물질 : 에리스로마이신
- 9) 60세 이상의 노인

3. 이상반응

1) 에바스틴 관련 이상반응

- 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.

- 정신신경계 : 졸음, 신경과민, 마비감, 무력증, 의기소침, 흥분, 때때로 권태감, 드물게 두통이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 구역, 구토, 복통, 위장장애 때때로 구갈, 위부불쾌감, 드물게 이구공내건조, 설염, 설사, 변비가 나타날 수 있다.
 - 간 : 때때로 AST·ALT, LDH, Al-P의 상승이 나타날 수 있다.
 - 과민증 : 발진, 부종이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 경미한 체중증가, 호산구증다증, 흉부압박감, BUN 상승, 당뇨를 나타날 수 있다. 유사약(테르페나딘 등)에 의해 QT연장, 심실성 부정맥(토르사드 드 포인트 포함)이 나타났다는 보고가 있다.
- 2) 슈도에페드린 때문에 특히 교감신경흥분제의 과민증인 환자에서, 구강건조, 과민증, 흥분, 불면, 현기, 두통이 나타날 수 있고, 장기투여시 오심, 구토를 일으킬 수 있다. 또한 빈박, 동계를 일으킬 수 있으며, 기타 다른 증상이 나타나면 의사와 상담해야 한다.

4. 일반적 주의

대부분의 환자에서 이 약을 복용한 후 졸음을 경험하지 않았으나 자동차 운전 혹은 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하는 사람은 이 약에 대해 자신의 반응이 익숙할 때까지 주의할 필요가 있다.

5. 상호작용

- 1) 이 약은 피부알러지시험을 방해할 수 있으므로 치료중단후 5-7일 후까지는 실시되어서는 안된다.
- 2) 이 약은 다른 항히스타민제와 효과를 증강시킬 수 있다.
- 3) 이 약은 모노아민옥시다제 저해제(IMAO) 병용 투여시 심각한 혈관성 고혈압을 일으킬 수 있으므로 병용투여하지 않아야 한다. 또한, 다른 약물(메칠도파, 메카밀아민, 리서핀, 맥각 알칼로이드)의 혈압강화효과를 감소시킬 수 있다.
- 4) 다른 교감신경흥분성 약물과의 병용투여는 상가효과를 일으키며, 독성을 증가시킬 수 있다. 유사하게 일부의 항고혈압제(베타-차단제)와 상호작용할 수 있다.
- 5) 이 약의 성분은 알코올의 효과를 증대시키지 않는다.
- 6) 이 약에 함유된 에바스틴을 에리스로마이신과 병용투여시, 에리스로마이신이 이 약의 대사를 억제하여 혈중 농도를 2배 상승 시켰다는 보고가 있다.
- 7) 이 약에 함유된 에바스틴을 케토코나졸 또는 에리스로마이신과 병용 투여시 케토코나졸 또는 에리스로마이신 단독투여 시 보다 QT 간격이 10msec 상승하는 것으로 보고되었다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
- 2) 동물실험(랫트)에서 이 약이 유즙으로 이행된다는 보고가 있으므로 이 약을 투여중에는 수유를 중단한다.

7. 과량투여시의 처치

이 약의 과량투여의 경우 위장관 세척과 증상 치료 및 ECG를 포함한 활력징후 모니터링 등 생명을 유지하는데 필요한 치료를 긴급하게 시행해야 한다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

- 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관
- 포장단위 : 자사포장단위
- 사용기한 : 외부포장 참조

- 제조자 : 풍림무약㈜ 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-1
- 제조의뢰자 : 안국약품㈜ 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-2

■ 본 제품은 공정거래 위원회가 고시한 소비자피해보상규정에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다. 유통도중 사용 기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 약품은 교환하여 드리오니 담당사원을 통하여 폐사로 송부하여 주시기 바랍니다.
안국약품(주) • 소비자 상담실 TEL. (02)3289-4253 ~ 9 • 수신자부담 080-001-4125

* 이 첨부문서 작성일자(2009년 4월 22일)이후 변경된 내용은 (홈페이지)나 (전화번호)에서 확인할 수 있습니다.

AG090422



건강의 동반자
인국약품(주)

• 본사: 서울특별시 영등포구 대림동 993-75 • 공장: 경기도 화성시 향남읍 상신리 903-2