

※ 이 문서는 본제를 사용할시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.

KGMP
우수의약품지정업체

아이월드

갈근탕엑스과립

일반의약품
분류번호: 114

I-05

【원료약품 및 그분량】 1회용량(2.5g)중

갈근탕건조엑스(생규)	1496mg
갈근(KP)	2.67g
대추(KP)	1.33g
계지(생규)	1.00g
작약(KP)	1.00g
간강(KP)	0.33g
감초(KP)	0.67g
마황(KP)	1.33g

동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 황갈색의 과립제

【효능·효과】 감기, 코감기, 두통, 어깨결림, 근육통, 손과 어깨통증

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(2.5g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전 적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고혈압 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.) 2) 심장에 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.) 3) 신장에(신장장애) 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.) 4) 부종(부기) 환자 5) 당뇨병에 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.) 6) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.) 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 8) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 떨어진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.) 9) 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신무력감 등이 나타날 수 있다.) 10) 갑상선기능항진증 환자(질환 및 증상이 악화될 수 있다.) 11) 당뇨병 환자 (마황(에페드린 류)에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자). 13) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여받고 있는 환자) 14) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여할 것.) 15) 어린이(어린이에 대한 안정성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.)). 16) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하고, 칼륨제 투여 등 적절한 처치를 받을 것. (3) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함), 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (4) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 (6) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등 (7) 비뇨기계 : 배뇨장애 (8) 기타 : 습진, 피부부염 등의 악화 (2) 수일 간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 3) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계 제제(테오필린, 디프로필린)와 병용(함께 복용) 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것. 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨 혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

【제조/판매원】 (주)아이월드제약 / 인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)

문서개정일 : 201707

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



I - WORLD PHARM.
invention innovation improvement

