

아이월드 당귀작약산엑스 과립

일반 의약품
분류번호 : 253

【원료약품 및 그분량】 1회용량(2.5g)중

당귀작약산건조엑스(생규)	1399mg
당귀(KP)	1.00g
천궁(KP)	1.00g
작약(KP)	2.00g
복령(KP)	1.33g
백출(KP)	1.33g
택사(KP)	1.67g

【성 상】 옅은 회황색의 과립제

【효능·효과】 비교적 체력이 허약하고 냉증으로 빈혈의 경향이 있으며 피로하기 쉽고 특히 하복부통, 머리 무거움, 어지러움, 어깨결림, 귀울림, 두근거림 등을 호소하는 다음 증상 : 월경불순, 월경이상, 월경통, 갱년기장애, 산전산후 또는 유산에 의한 장애(빈혈, 피로권태, 어지러움, 부종(부기)), 어지러움, 머리 무거움, 어깨결림, 요통, 하지(다리)의 냉증, 동창(언 상처), 부종(부기), 기미

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(2.5g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 2) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등
 - (2) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 20130126

※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr

