

아이월드 배농산급탕엑스과립

【원료약품 및 그분량】 1회용량(2.5g)중

배농산급탕건조엑스(별규)	758mg
길경(KP)	1.33g
감초(KP)	1.00g
대추(KP)	1.00g
작약(KP)	1.00g
전강(KP)	0.33g
지실(KP)	1.00g

【성상】 적갈색의 과립제

【효능·효과】 발적(총혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농성질환

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(2.5g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사 때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 발적(총혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한, 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다..))

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 피부 : 발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등
- (4) 소화기계 : 위부불쾌감 등

2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이징)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 201605

※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박로 31(논현동)
www.i-pharm.kr

