

아이월드 오 령 산엑스과립

일반의약품

분류번호 : 239

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g)중

택사(KP)	2.00g
복령(KP)	1.50g
백출(KP)	1.50g
저령(KP)	1.50g
계지(생규)	1.00g

이상 건조엑스로서 0.78g

【성 상】 옅은 적갈색의 과립제

【효능·효과】 목마름, 요량감소, 구역, 구토, 복통 등 어느 것을 수반하는 다음 증상 : 물설사, 급성 위장염(대변이 조금 나올 뿐 배변이 끝난 느낌이 없는 상태에는 사용하지 말 것.), 더위먹음, 두통, 부종(부기)

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(3.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- 2) 1개월(급성 위장염에 복용할 경우에는 5~6회, 물설사, 더위먹음에 복용할 경우에는 5~6일) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 02)597-1020



문서개정일 : 20100107

※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을수 있습니다.



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 논현동 430-1
www.i-pharm.kr

