

아이월드 온 청 음 엑스 과립

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g) 중

당귀(KP)	1.33g
숙지황(KP)	1.33g
작약(KP)	1.33g
천궁(KP)	1.33g
황련(KP)	0.67g
황금(KP)	1.00g
치자(KP)	0.67g
황백(KP)	0.67g

이상수침건조엑스 1250mg

동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 담황갈색의 과립제

【효능·효과】 피부의 색과 윤기가 좋지 않고 상기(기혈이 머리 쪽으로 치밀어 오름)가 있는 사람의 다음 증상 : 월경불순, 월경곤란, 갱년기장애, 신경과민

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(3.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사 때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose amabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 신생아
- 2) 수유부
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 위하수, 위무력이 있는 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 2) 위장이 허약하고 설사하기 쉬운 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 3) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 4) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.)).

5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(2) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐) 등

2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080) 597-1020

문서개정일 : 201701

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 3(논현동)
www.i-pharm.kr

