

전문약품
분류번호 312

활성 비타민 B₁

푸르셀타민_주

Fursultamin inj.
푸르셀티아민염산염

-비타민B₁(thiamine)이 결핍되면 몸이 나른해지고 쉽게 지쳐 피로를 빨리 느끼게 되며 심하면 각기병에 걸리게 됩니다. 인체의 필요량은 소량이기 때문에 비타민B₁(thiamine)을 다량 섭취해도 잉여량은 소변으로 배출됩니다.

-푸르셀티아민(Fursultamine)은 Thiamine을 화학적으로 합성한 유도체로 비타민B₁의 체내 흡수율이 높아 활성비타민B₁이라 불립니다. 푸르셀티아민은 보조인자(Cofactor)로 전환이 잘되어 생체 이용률이 높습니다. 또한 쉽게 파괴되지 않고 흡수가 잘되어 혈중 농도가 높습니다. 신경과 근육조직에 침투가 잘되고 지속적으로 작용하는 푸르셀티아민은 비타민 B₁ 결핍 및 대사 장애에 관여하는 신경기능 장애를 개선합니다.

- 푸르셀타민주는 활성비타민 B₁인 푸르셀티아민 성분을 사용하여 만든 주사제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1 mL 중

주 성 분 : 푸르셀티아민염산염(푸르셀티아민 5mg) (KP) 5.46mg
무통화제 : 포도당 (KP) 400mg
용 제 : 주사용수 (KP) 적량

【성상】

무색의 투명한 액을 담고 있는 갈색의 앰플입니다.

【효능·효과】

1. 비타민B₁ 결핍증의 예방 및 치료
2. 비타민B₁의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성 질환, 갑상샘기능항진증, 임부, 수유부, 격렬한 육체 노동시 등)
3. 베르니케뇌병증(Wernicke encephalopathy)
4. 각기심장 장애
5. 다음 질환에 의한 비타민B₁의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 신경통
 - 2) 근육통, 관절통
 - 3) 말초 신경염, 말초 신경 마비
 - 4) 심근대사 장애
 - 5) 변비 등의 위장 운동 기능 장애
 - 6) 수술 후 장관 마비

비타민B₁의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우에 대하여 효과가 없는대 1개월가량 목적 없이 사용해서는 안됩니다.

【용법·용량】

푸르셀티아민으로서 보통 성인 1일 5 ~ 100mg을 피하, 근육내 또는 정맥내 주사하십시오. 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응이 나타날 수 있으므로 사용 시 유리파편의 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 소아, 고령자 사용 시에는 특히 주의합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오

이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

약물 과민반응의 병력이 있는 환자

4. 이상반응

1) 중대한 이상반응

드물게 쇼크를 일으키는 일이 있기 때문에 관찰을 충분히 하고 혈압저하, 가슴내통증, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.

2) 그 외의 이상반응

(1) 과민반응 : 드물게 발진 등의 과민반응이 나타나는 일이 있으므로 증상이 나타날 때에는 투여를 중지합니다.

(2) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 설염, 때때로 설사

(3) 기타 : 때때로 두통, 빈뇨

5. 적응상의 주의

- 1) 정맥내 주사에 의해 혈관통증을 일으키는 일이 있기 때문에 주사속도는 가능한 한 천천히 주사합니다.
- 2) 주사액 사용시의 일반적인 주의로서, 세균등에 의한 오염을 피하기 위해 일부 사용후의 잔액은 사용하지 않습니다.
- 3) 앰플 컷 : 이 약은 원포인트 컷 앰플을 사용하고 있으므로, 앰플 머리 부분의 마크를 위로 해 반대측(아래쪽 방향)에 가볍게 힘을 더해 컷을 합니다. 덧붙여 앰플을 자를 때 이를 혼입을 피하기 위해, 윗부분 주위를 에탄올면 등으로 닦아서 깨끗이 합니다. (앰플에 한함.)

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

【포장단위】

(1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 20mL) X 10앰플, 50앰플

【저장방법】

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)에서 보관

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 병·의원 또는 약국을 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2016년 4월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencrosswb.com) 나 소비자상담실 (031-629-8690)로 문의하시기 바랍니다.

제조 및 판매자

 **녹십자웰빙**

충청북도 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26
TEL:031)629-8600 소비자상담실 ☎031-629-8690