

활용담사간탕 엑스과립

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶잔뇨감 ▶혼탁뇨 ▶배뇨통 ▶생·대하

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

당귀 (KP)	1.67g
지황 (KP)	1.67g
목통 (KP)	1.67g
황금 (KP)	1.00g
택사 (KP)	1.00g

차전자 (KP)	1.00g
웅담 (KP)	0.50g
치자 (KP)	0.50g
감초 (KP)	0.50g
이상수침연조엑스 1.4g	
동물유래성분(웅담수화물/소/우유)	

성 상 : 갈색의 과립

효능·효과 : 비교적 체력이 있고, 하복부 근육이 긴장하는 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 배뇨(소변을 누)통, 잔뇨감(소변을 누고 난 후에도 다 누 것 같지 않은 느낌), 혼탁뇨, 대하(질분비물)

용법·용량 : 보통 성인 1회 1포(3.0g)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
1) 고혈압 환자 2) 심장예 또는 신장예(신장(콩팥)장애) 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 위장이 허약하고 설사하기 쉬운 환자(식욕부진, 위 부불쾌감, 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.) 5) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 8) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감령(줄임)하는 등 주의할 것.) 10) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 성당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (2) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등 (3) 위알도스테론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (4) 근 병성(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.
- 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 60포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.