

속콜큐어

캡슐

KGMP
일반의약품
분류번호 : 222

【성상】 흰색 내지 미백색의 분말이 든 상 초록색, 하 흰색을 띤 경질캡슐제

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐(409mg)중 유효성분:

노스카민(KP)	10mg
di-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg
구아아닐살폰산칼륨(USP)	45mg
덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP)	10mg

첨가제(타르색소): 황색203호, 녹색3호

첨가제(동물유래): 유당수화물(2~7년, 네덜란드산 소의 우유)

기타첨가제: 유당수화물, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 경질캡슐

【효능 효과】 기침 가래

【용법·용량】 만6세 이상의 성인: 1회 2캡슐씩 1일 3회 식후에 복용하십시오.
만8세~44세의 어린이: 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 알부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 달걀에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 진해기침을 그치게 함(가래제), 감기약, 항스타민제를 함유하는 내복약제(코열용경구제, 알미약, 알레르기용약, 진정제)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 차과 의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 2) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간질질환, 신장(腎臟)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장(眼), 눈의 통증, 눈이 침침함(눈물), 배뇨(小便)변을 느꼈던 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 알부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 6) 의사 또는 차과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침
만성기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 차과 의사, 약사와 상의 하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(小便)변을 느꼈던, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
- 3) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(誤用) 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】 10캡슐/PTP

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【설명서 개정년월일/ 관리번호】 2019.12.13 / P2010-04

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국 개설자 또는 약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 '소비자 분쟁 해결기준'에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
※ 약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정 연월일(2019.12.13) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해 구제신청: 한국약물관리안전관리원(1644-6223)

제출·판매



일약약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실: 080-021-1010(주선요금부담반려)
학술상담실: 02-570-3888 홈페이지: www.lyang.co.kr