

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,441mg)중

아스코르브산(KP) ----- 75mg
 에르고칼시페롤(KP) ----- 400 IU
 니코틴산아미드(KP) ----- 20mg
 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) 0.12mg
 첨가제(타르색소) : 황색4호,적색4호,청색1호

티아민염산염(KP) ----- 2mg
 레티놀팔미테이트(USP) ----- 5000 IU
 리보플라빈(KP) ----- 3mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP) 0.024mg

첨가제(동물유래) : 젤라틴, 소(Bovine)가죽의 안쪽부위에서 유래

[성상] 황갈색의 내용물이 든 초코렛색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과] 다음 경우의 비타민 A, D, B₁, B₂, C 의 보급 :

- 육체피로, 임신수유기, 병중병후의 체력저하시, 발육기 및 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 비타민A: 눈의 건조감의 완화, 야맹증
- 비타민D: 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 않는다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 과칼슘혈증 (hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 3개월 미만의 영아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. (복용 전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 1세 미만의 영아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
- 4) 과산화노증환자 (hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부, 수유부
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 취장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 7) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 부작용

- 1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 묽은 변 등의 증상의 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 고용량의 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU이상을 넘지 않도록 한다.

6. 임부수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 2) 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

7. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

8. 저장상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오남용을 피하고, 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장단위] 자사포장단위 [사용기한] 제조일로부터 36개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054-552-5381~2)로 문의하시기 바랍니다.

개정일자 : 2015.03.30



알파제약
 경북 문경시 산업면 산업공단2길 20