

말초 및 뇌혈관질환 개선제

베나프로 캡슐

(수산나프로닐)

원료약품의 분량 : 1캡슐 중

수산나프로닐(KPC) 100mg

성 상 : 상하 적색 캡슐 내의 백색 분말**효능효과 :** 1. 뇌혈행 및 뇌영양장애에 의한 증상
2. 말초, 내이, 눈의 망막·맥락막 혈행 및 영양장애**용법용량 :** 성인 : 수산나프로닐로서 1회 100mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.**사용상의 주의사항****1. 다음환자에는 투여하지 말 것**

- 1) 급성 심근경색 환자
- 2) 출혈성 상해 초기 환자
- 3) 기립성 조절장애 환자
- 4) 이 약에 과민증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

중증의 신부전 환자

3. 부작용

- 1) 정신신경계 : 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지러움 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 간염이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다.

5. 상호작용

혈압강화제와 병용투여시 혈압강화작용이 증강될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 2) 모유중으로의 이행이 보고되었으므로 수유중에는 투여하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량투여에 의해 심전도억제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터 하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관**포장단위 :** 30캡슐, 300캡슐**사용기간 :** 제조일로부터 36개월※이 설명서 작성개정 년 월 이 후 변경 된 내용은 홈페이지 (www.hawonpharm.co.kr)의 제품 정보를 통해 확인하십시오.※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품등 정보」를 참조하세요.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정년월 2010.10

제 조 자 : (주)드림파마

경기도 화성시 향남읍 상신리 902-3

제조의뢰자 :



하원제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3
<http://www.hawonpharm.co.kr>