

항히스타민제

알세틴정

(레보세티리진염산염)

○ 셀트리온제약
● CELLTRION ACT110

전문의약품
분류번호:141



【현료약품 및 그 분량】1정 중
레보세티리진염산염(LSP) 5mg
동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유)

【성상】
흰색 또는 연한 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

다음 질환의 증상 완화

1. 계절성 알레르기성 비염 또는 다반성 알레르기성 비염·지속적 알레르기성 비염 포함

2. 만성 특발성 두드러기

3. 가려움증을 동반한 피부염 및 습진(하이드로코르티손 외용제와 병용)

【용법·용량】

성인 및 6세 이상의 소아 : 식사에 상관없이 1회 1정(알세틴레보세티리진염산염 5mg), 1일 1회 경구투여한다. 연령, 증상 등에 따라 적절히 증감한다.

신장에 미치는 신장기능(크레아티닌 청소율(Cl_{CR} (ml/min))에 따라 용량을 조절한다.

크레아티닌 청소율 Cl_{CR} (ml/min)	용량 및 횟수
경증 $50 \leq Cl_{CR} < 80$	1회 1정, 1일 1회
중등증 $30 \leq Cl_{CR} < 50$	1회 1정, 2일 1회
중증 $10 \leq Cl_{CR} < 30$	1회 1정, 3일 1회

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 성분 및 히드록시진 또는 피페라진유도체에 대해 과민증이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자

2) 신부전 환자($Cl_{CR} < 10$ ml/min), 혈액투석을 받고 있는 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

4) 1세 미만의 영아에게 이 약을 투여해서는 안 되고, 6세 미만의 유아에게는 정제가 아닌 액제를 투여할 것.

5) 정제에서 이 약이 용해를 할 수 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency), 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose maldigestion) 등 유전적인 문제가 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다. (유당 함유 제제에 한함)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 신장장애(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

2) 간장애(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

3. 이상반응

1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 두들기 기법과 일시적인 나

2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상

3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 협심증, 때때로 심박변동이 나타날 수 있다.

4) 혈액계 : 혈관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 임파구증가, 호산구증가, 드물게 단핵구증가, 혈소판증가, 혈소판감소가 나타날 수 있다.

5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시스, 쇼크, 때때로 부종, 두드러기, 소양감, 혈관부종이 나타날 수 있다.

6) 눈 : 드물게 시야흐림, 결막홍염이 나타날 수 있다.

7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈의 상승이 나타날 수 있다.

8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요침양이 나타날 수 있다.

9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 홍통, 드물게 혈중농도, 미열이 나타날 수 있다.

10) 1세 이상 6세 미만의 소아에 대한 임상시험 결과, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 발열, 설사, 구토, 용이염이었다.

11) 시판 후, 공격성, 환각, 우울, 경련, 시각이상, 호흡곤란, 두드러기, 고령자, 골밀진, 사망증, 간염, 근육통, 체중증가, 식욕증가, 불면, 자살생각, 현기증, 실신, 전진, 미각이상, 폐노출, 소변고인, 부종이 추가로 보고되었다.

12) 국내 시판 후 조사결과

가, 국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 1866명(정제:1701명, 액제:165명)의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과와 유효사례의 발현율은 1.13%(21명/1866명), 25건이었다. 주 유효사례는 졸음 0.27%(5명/1866명), 진정 0.21%(4명/1866명), 어지러움 0.11%(2명/1866명)등의 순이었다. 이 중 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 0.64%(12명/1866명, 12건)으로 보고되었으며 졸음 0.27%(5명/1866명), 진정 0.21%(4명/1866명), 어지러움 0.11%(2명/1866명), 두통 0.05%(1명/1866명)의 순이

었다. 증대한 유효사례는 약과의 인과관계에 상관없이 압박골절 및 폐렴 각 0.05%(1명/1866명, 1명)이며, 예상치 못한 유효사례는 약과의 인과관계에 상관없이 구내염, 가래 이상, 후비루, 호흡곤란, 척감각, 고혈압, 압박골절, 폐렴이 각 1건씩 보고되었다.

나, 재심사 기간동안 자발적인 보고, 임상시험 및 문헌정보등을 통해 보고된 예상치 못한 약물유해반응으로 근육통 2건, 두통증가 1건, 여드름 1건, 고혈압 1건, 두드러기 1건, 복부발만 1건, 체중증가 1건으로 총 8건이 보고되었다.

4. 일반적 주의

1) 이 약 복용 후 졸림, 피로, 무력증이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계조작같이 기민함을 요구하는 작업을 행할 경우 졸려 주의를 기울여야 한다.

2) 기민함을 감소시키거나 중추신경계 작용을 추가로 떨어뜨릴 수 있으므로 이 약과 알코올, 항우울제와 같이 복용하는 것은 피해야 한다.

3) 레보세티리진은 요저류의 위험을 증가시킬 수 있으므로 요저류의 선행 요인(예: 척수장애, 전립선 비대)에 있는 환자에게 투여할 경우 주의해야 한다.

5. 상호작용

1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용하여 하지 않는다.

2) 리세미드(광학이성질체)인 세티리진의 경우에는 알코올의 영향을 증가시키지 않을 것으로 보여지나(0.5 g/L, 혈액 수준), 레보세티리진과 알코올 또는 기타 CNS 억제제를 병용투여하는 경우 경계성이 추가로 감소될 수 있고 수면 장애를 야기할 수 있다.

3) 레보세티리진과의 상호작용을 분석한 연구는 없지만 이성체인 세티리진과의 상호작용을 분석한 연구가 있는데 안티피린, 슈도에페드린, 에리스로미아신, 아지스로마이신, 케토코나졸, 시메티딘과는 상호작용이 없었다. 테오필린(1일 400mg)과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한 (6%) 감소로 보였다.

4) 리토나비르는 세티리진의 반감기 증가(53%) 및 클리어런스 감소(29%)와 함께 혈장 AUC를 42%까지 증가시켰다. 리토나비어의 약물동태는 세티리진과의 병용투여로 인해 약간 변화(1% 감소)되었다.

5) 음식과 같이 복용시 흡수 속도는 달라지지만 흡수되는 총량은 감소하지 않는다.

6. 임부 및 수유부, 기임여성에 대한 투여

1) 동물 시험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.

2) 이 약 성분의 이성체인 세티리진이 모유를 통해 분비되기 때문에 이 약 성분도 모유 중에 분비될 가능성이 있으므로 수유 중에는 투여를 금하여야 한다.

3) 이 약은 수태후에 미치는 영향에 관한 동물시험은 실시되지 않았다.

7. 소아에 대한 투여

1) 12세 미만 소아에서의 권장용량은 성인 및 소아 환자에서 이 약의 전신 노출 정도와 안전성 프로파일을 비교하여 설정되었다.

2) 1세 미만의 영아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에게는 혈중 농도 증가 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 한 차이를 한다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르겐 피부반응을 억제하므로 알레르겐 피부반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.

10. 과량투여시의 처리

1) 성인은 과량투여시 졸림이 나타나고 소아의 경우 초조와 안절부절이 선행된 후 졸림이 나타난다.

2) 이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시한다. 단기간에 과량투여시 위 세척을 실시한다.

3) 이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않는다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 30정, 100정

제 조 자 : (주)셀트리온제약 / 총판매처 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

(소비자상담실 : 080-850-3611~2) 수신부담

* 이 제품 설명서 작성일자(하단에 표시) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.celltrionph.com), 온라인약도서관 (<http://drug.meds.go.kr>) 또는 문의전화(02-2216-3611(내선3))에 확인 하실 수 있습니다.

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.

* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

* 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 측면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

작성일자 T-2016.04.22

관리번호 ACT11-110