

아이월드 시호계지탕엑스립

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g)중

시호(KP)	1.67g	반하(KP)	1.33g
계지(생규)	1.00g	황금(KP)	0.67g
인삼(KP)	0.67g	대추(KP)	0.67g
감초(KP)	0.67g	건강(KP)	0.33g
작약(KP)	1.00g	이상 물건조엑스	1300mg

동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)

【성 상】 황갈색의 과립제
【효능·효과】 대부분 복통을 수반한 위장염, 미열·추위·두통·구역이 있는 감기, 감기 후기 증상

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(3.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 부종(부기) 환자
 - 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).)
 - 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상 인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지저림, 마비 등의 이상이 확인되는 경우

복용을 중지할 것.

- (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등
- (4) 비뇨기계 : 소변을 자주 봄, 배뇨통, 혈뇨, 잔뇨감, 방광염 등의 증상
- (5) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등
- (6) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 확인된 경우 복용을 중지할 것.
- (7) 간질성폐렴 : 발열, 기침, 숨참, 호흡곤란, 폐음이상(염발음,捻髮音) 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고, 신속하게 흉부X선 등의 검사를 실시함과 동시에 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 받을 것.
- 2) 1개월(감기의 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린 산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
 - 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
 - 5) 유사처방인 소시호탕에서 인터페론 알파와 병용(함께 복용)시 간질성폐렴의 이상 반응이 많이 보고되었다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 500g, 120포

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 201702

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.
- ※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.


(주)아이월드제약

 인천광역시 남동구 함박로316(논현동)
www.i-pharm.kr
