

아이월드 삼항사심탕엑스립

* 이 문서는 본제를 사용함에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.

F01350

일반의약품
분류번호: 219

【원료약품 및 그분량】 1회용량(2.0g) 중

대황(KP)	0.67g
황련(KP)	0.50g
황금(KP)	0.50g

이상 물건조엑스 320mg

동물유래성분 : 유당소화물(소의 우유)

【성 상】 황갈색의 과립제

【효능·효과】 비교적 건강하나 역상기(기혈이 머리쪽으로 치밀어 오름)가 있고, 안면(얼굴)홍조(얼굴이 붉어짐), 정신이 불안하고, 변비 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(홍조, 어깨결림, 귀울림, 머리무거움, 불면, 불안), 코피, 치질로 인한 출혈, 변비, 갱년기 장애, 혈열증

【용법·용량】 보통 성인 1회 1회용량(2.0g)을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose amlabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.)
- 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유 중으로 이행되어 유아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유부에는 투여하지 않는다. 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중지한다.)
- 오한 또는 설사의 경향이 있는 사람
- 현재저 체력이 쇠약한 환자
- 신생아

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사약

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 현재저게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 계속된 출혈이 있는 환자.

- 지금까지 이 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여받고 있는 환자)
- 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(줄임)하는 등 주의할 것.)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 통증을 동반한 설사, 복통, 변비, 설사 등
 - 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - 묽은 변·설사의 증상이 계속 또는 증강하는 경우
- 1개월(코피에 복용하는 경우 5~6회, 치질로 인한 출혈, 변비, 역상기가 있는 변비에 복용 시 1주)정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것. 대황 함유제제는 특히 주의할 것.
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 특히 주의할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 500g

【소비자상담실】 080) 597-1020

문서개정일 : 201701

* 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

* 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr

