

순환장애 개선제

【분류번호 : 219】

【전 문 의 약 품】

카나쿨린®정

(칼리디노게나제)

CARNACULIN® Tablet

카나쿨린정은 생체고유의 고단백 분해효소인 칼리디노게나제를 함유하고 있으며, 혈장중의 키니노겐에 작용하여 키닌을 유리시킵니다. 유리된 키닌은 말초혈관 확장작용과 미세순환항진에 기인한 혈류 증가작용 및 조직대사 개선작용을 나타냅니다. 또한 고혈당에 의한 망막의 미세혈관장애인 당뇨병성 망막증의 증상을 개선합니다.

■원료약품 및 그 분량 : 1정 중

칼리디노게나제(JP).....50 IU.

동물유래 : 돼지췌장

첨가제(타르색소) : 황색 5호

■성상 : 주황색 원형의 장용성 필름코팅정

■효능·효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망맥락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

■용법·용량

1일 30~150 IU. 를 3회 분할하여 경구투여 합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 부작용
 - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있습니다.
4. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

■저장방법 : 밀폐용기

■사용기한 : 외부 포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

■포장단위 : 100 정

■소비자상담 : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2015년 2월 3일)이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품검색 란을 참조하세요.

최초 작성연월일 : 20080626

최종 개정연월일 : 20150203

수입자 :

❖ 코오롱제약

대저광역시 대덕구 유평서로 188

제조사 :



Sanwa Kagaku Kenkyusho Co., Ltd. FUKUSHIMA Factory
5KK 1 Kogyodanchi, Monden-machi, Aizuwakamatsu, Fukushima, Japan