

120캡슐

일반의약품
분류번호 231

KGMP

경부공업지역제조

잇몸질환치료제

덴드스 연질캡슐


옥수수불검화정량추출물

잇몸의 염증

치주질환

치은염

치주염



동근당 계열회사 Kyongbo Pharm

- 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중 옥수수불검화정량추출물(KPC) 35mg (중 스테롤(베타-시토스테롤)로서 7mg)
- 착색제 : 식약청인정타르색소적색40호, 황색203호, 황색5호
- 성상 : 황색의 내용물이 든 주형색의 타원형 연질캡슐
- 효능·효과 : 다음 질환에 사용할 수 있습니다. 치주질환(치아지조직 질환, 치은염, 치주증(유년형 치주염))
- 용법·용량 : 성인 : 초기량으로는 옥수수불검화정량추출물로서 1회 70mg, 1일 3회 식전에 경구 투여합니다. 유지량으로는 1회 35mg, 1일 3회 식전에 투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환·환불 받을 수 있습니다.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 작성일(2009년 10월 08일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr) 또는 소비자상담실(080-612-8690 수신자부담)로 문의하시어 확인할 수 있습니다.
- 제조원 : (주)동구제약 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-3
- 판매원 : **동근당** 계열회사 경보제약
본사 : 충청남도 아산시 실목동 345-6번지
서울사무소 : 서울 서대문구 충정로 3가 368번지
- 제조번호 :
사용기한 :

120캡슐

일반의약품
분류번호 231

KGMP

경부공업지역제조

잇몸질환치료제

덴드스 연질캡슐


옥수수불검화정량추출물

잇몸의 염증

치주질환

치은염

치주염



동근당 계열회사 Kyongbo Pharm

• 사용상의 주의사항 : 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응 환자 2) 대두유에 과민하거나 일러르기 병력이 있는 환자 3) 중 또는 말초에 과민증이 있는 환자 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 아스피린, 아세트살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다. 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다. 3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.) 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 허혈성 동맥질환 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자는 주의합니다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상임시 가능한 한 이 성분투여를 중지하십시오. 1) 가벼운 완화작용을 일으킬 수 있습니다. 2) 신식 또는 민성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계 등에 과민 반응을 유발할 수 있습니다. 4. 일반적 주의 - 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 제외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정제를 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 위험성으로 인해 제외되는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

